

PENTHROX[®]

(metoxiflurano)

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE METOXIFLUORANO

Esta lista es esencial para asegurar el uso seguro y eficaz de metoxiflurano y su objetivo es ayudarle a seleccionar a los pacientes adecuados.

NO administre metoxiflurano si el paciente presenta:

- Edad inferior a 18 años
- Inestabilidad cardiovascular
- Hipersensibilidad a metoxiflurano (o a cualquier anestésico fluorado)
- Temperatura elevada por un anestésico (hipertermia maligna)
- Disminución de la conciencia (incluso debido al alcohol)
- Insuficiencia renal
- Insuficiencia pulmonar o respiratoria
- Insuficiencia hepática tras el uso previo de metoxiflurano o de anestesia con hidrocarburos halogenados

NO administre metoxiflurano si el paciente está tomando alguno de los siguientes fármacos:

- Inductores del sistema enzimático CYP-450 (p. ej. alcohol, isoniazida, fenobarbital, rifampicina, nevirapina, efavirenz o carbamaepina).
- Antibióticos con efecto nefrotóxico conocido (por ejemplo tetraciclina, gentamicina, colistina, polimixina B o anfotericina B).
- Depresores del SNC: el uso concomitante con metoxiflurano puede producir efectos depresivos additves y los pacientes deben ser supervisados estrechamente.

- Asegúrese de que se administra la dosis más baja requerida y que no se supera la dosis máxima de 6 ml (2 viales).
- Instruya al paciente en la administración correcta de metoxiflurano.
- Lea la Ficha Técnica antes de la administración.
- Entregue al paciente el Prospecto y la Tarjeta de información para el paciente.

Notificación de sospechas de reacciones adversas.

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente o a través del formulario electrónico disponible en <https://www.notificarAM.es>

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Octubre-2021

Disponible en la web de la AEMPS <https://www.aemps.gob.es>

Medical Developments NED B.V.

Strawinskylaan 411, WTC Tower A, 1077XX Amsterdam, The Netherlands

Internet: www.eu.medicaldev.com/es E-Mail: SafetyMDI.Spain@pharmalex.com Teléfono: 0034 912 58 29 95