

¿Cómo deben utilizar Increlex® los pacientes?

- ✿ Increlex debe administrarse **dos veces al día**.
- ✿ Increlex debe administrarse **justo antes** o **justo después de una comida**.
- ✿ Si una dosis de Increlex no puede administrarse justo antes o después de una comida, esa dosis no deberá ponerse.
- ✿ Preste atención a posibles signos y síntomas de niveles bajos de azúcar en sangre tal y como su médico o enfermero le han recomendado. Lleve siempre consigo algo de azúcar para poder tomarlo en caso de que tales signos o síntomas aparezcan.
- ✿ Utilice un lugar de **inyección diferente** con cada dosis.

Alternar los lugares de inyección

- ✿ Abdomen ✿ Nalga
- ✿ Muslo ✿ Parte superior del brazo

- ✿ Si deja de administrarse una dosis de Increlex, en ningún caso deberán de aumentarse las dosis siguientes para compensar una o más dosis olvidadas. La siguiente dosis deberá administrarse a la hora habitual.
- ✿ Increlex debe mantenerse en nevera pero NO congelarse.

Conservar entre 2°C y 8°C

Notificación de sospechas de reacciones adversas

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaRAM.es>

V7_ES_GUIADOSIS_11/2021



Guía de dosificación

En la parte posterior de esta página encontrará una ficha de información extraíble para entregar a sus pacientes tratados con Increlex. Complete el nombre del paciente y la dosis antes de entregar la ficha a su paciente –contiene información útil e importante sobre cómo administrar Increlex.

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Enero 2022

Disponible en la página web de la AEMPS www.aemps.gob.es

- ▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

Cómo usar esta guía (guía para el prescriptor)

Las tablas de la página siguiente se han diseñado para ayudarle a calcular la dosis adecuada para su paciente. Una vez ajustado el peso del paciente en la primera columna, el número que aparece debajo de la dosis en mg/kg indica las unidades correspondientes de la jeringa.

La dosis (en unidades) por inyección se calcula utilizando la siguiente fórmula:

$$\text{Peso (Kg)} \times \text{dosis individual (mg/kg)} \times 10 = \text{unidades por inyección}$$

La dosificación inicial recomendada es de 0,04 mg/kg dos veces al día mediante inyección subcutánea. Si se tolera bien **durante al menos una semana**, puede incrementarse a razón de 0,04 mg/kg por dosis hasta un máximo de 0,12 mg/kg dos veces al día.

La dosis se calcula en unidades ya que Increlex se administra utilizando una jeringa de pequeño volumen desechable como la de insulina.

- ✿ La dosis varía de 0,04 mg/kg a 0,12 mg/kg dos veces al día.
- ✿ Las unidades de la jeringa varían de 2 unidades a 84 unidades.
- ✿ Con cada dosis debe alternarse el lugar de inyección.
- ✿ Increlex siempre debe administrarse justo antes o justo después de una comida.

Hipoglucemia

Si con las dosis recomendadas de Increlex, y a pesar de mantener un adecuado control de la ingesta de alimentos las hipoglucemias persisten, deberá reducirse la dosis del medicamento.

Notificación de sospechas de reacciones adversas

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente o del formulario electrónico disponible en <https://www.notificaRAM.es>

Para pacientes de 5 kg a 37 kg

Peso del paciente en (kg)	Dosis por inyección en mg/kg (dos veces al día)									
	.04	.05	.06	.07	.08	.09	.10	.11	.12	
5	2	3	3	4	4	5	5	6	6	
6	2	3	4	4	5	5	6	7	7	
7	3	4	4	5	6	6	7	8	8	
8	3	4	5	6	6	7	8	9	10	
9	4	5	5	6	7	8	9	10	11	
10	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
12	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
13	5	7	8	9	10	12	13	14	16	
14	6	7	8	10	11	13	14	15	17	
15	6	8	9	11	12	14	15	17	18	
16	6	8	10	11	13	14	16	18	19	
17	7	9	10	12	14	15	17	19	20	
18	7	9	11	13	14	16	18	20	22	
19	8	10	11	13	15	17	19	21	23	
20	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
21	8	11	13	15	17	19	21	23	25	
22	9	11	13	15	18	20	22	24	26	
23	9	12	14	16	18	21	23	25	28	
24	10	12	14	17	19	22	24	26	29	
25	10	13	15	18	20	23	25	28	30	
26	10	13	16	18	21	23	26	29	31	
27	11	14	16	19	22	24	27	30	32	
28	11	14	17	20	22	25	28	31	34	
29	12	15	17	20	23	26	29	32	35	
30	12	15	18	21	24	27	30	33	36	
31	12	16	19	22	25	28	31	34	37	
32	13	16	19	22	26	29	32	35	38	
33	13	17	20	23	26	30	33	36	40	
34	14	17	20	24	27	31	34	37	41	
35	14	18	21	25	28	32	35	39	42	
36	14	18	22	25	29	32	36	40	43	
37	15	19	22	26	30	33	37	41	44	

Para pacientes de 38 kg a 70 kg

Peso del paciente en (kg)	Dosis por inyección en mg/kg (dos veces al día)									
	.04	.05	.06	.07	.08	.09	.10	.11	.12	
38	15	19	23	27	30	34	38	42	46	
39	16	20	23	27	31	35	39	43	47	
40	16	20	24	28	32	36	40	44	48	
41	16	21	25	29	33	37	41	45	49	
42	17	21	25	29	34	38	42	46	50	
43	17	22	26	30	34	39	43	47	52	
44	18	22	26	31	35	40	44	48	53	
45	18	23	27	32	36	41	45	50	54	
46	18	23	28	32	37	41	46	51	55	
47	19	24	28	33	38	42	47	52	56	
48	19	24	29	34	38	43	48	53	58	
49	20	25	29	34	39	44	49	54	59	
50	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
51	20	26	31	36	41	46	51	56	61	
52	21	26	31	36	42	47	52	57	62	
53	21	27	32	37	42	48	53	58	64	
54	22	27	32	38	43	49	54	59	65	
55	22	28	33	39	44	50	55	61	66	
56	22	28	34	39	45	50	56	62	67	
57	23	29	34	40	46	51	57	63	68	
58	23	29	35	41	46	52	58	64	70	
59	24	30	35	41	47	53	59	65	71	
60	24	30	36	42	48	54	60	66	72	
61	24	31	37	43	49	55	61	67	73	
62	25	31	37	43	50	56	62	68	74	
63	25	32	38	44	50	57	63	69	76	
64	26	32	38	45	51	58	64	70	77	
65	26	33	39	46	52	59	65	72	78	
66	26	33	40	46	53	59	66	73	79	
67	27	34	40	47	54	60	67	74	80	
68	27	34	41	48	54	61	68	75	82	
69	28	35	41	48	55	62	69	76	83	
70	28	35	42	49	56	63	70	77	84	

Cómo utilizar Increlex®

Nombre del paciente:

Dosis en unidades:

Información de contacto

Nombre del médico:

Nombre del enfermero:

Teléfono de contacto/del consultorio:

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) Enero 2022

Disponible en la página web de la AEMPS

www.aemps.gob.es

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante comunicar los efectos adversos que pudiera usted tener. Puede consultar la forma de hacerlo en el prospecto del medicamento.