

Formulario de conocimiento del riesgo del uso de ▼ Topiramato durante el embarazo

Parte A: a cumplimentar y firmar por el médico

- Este formulario tiene como objetivo facilitar la reevaluación anual de sus pacientes, para asegurarse de que ellas o su(s) cuidador(es) </representante(s) legal(es)> han sido completamente informados y comprenden los riesgos relacionados con el uso de topiramato durante el embarazo.
- Lea, complete y firme este formulario de conocimiento del riesgo con su paciente tanto al inicio del tratamiento, como en su revisión anual, y en caso de que su paciente planee un embarazo o se haya quedado embarazada.
- Este formulario se debe utilizar junto con la guía dirigida a profesionales sanitarios, que contiene información detallada.
- El médico conservará/registrará una copia de este formulario cumplimentado y firmado.

Nombre y DNI de la paciente (si procede, también el nombre del cuidador </representante legal>)

Se ha evaluado la necesidad de tratamiento con topiramato para la paciente mencionada anteriormente



Confirмо que se han abordado los siguientes puntos con la paciente y/o padre(s)/cuidador(es) </representante legal>

Riesgos para los niños expuestos a topiramato durante el embarazo:

- sufrir malformaciones congénitas graves
- restricción del crecimiento fetal
- posible aumento del riesgo de trastornos del neurodesarrollo, incluidos trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)



(Si corresponde:) Riesgo de epilepsia no tratada para la madre y para el feto



Necesidad de una prueba de embarazo negativa antes del inicio del tratamiento (si la paciente ya ha alcanzado la menarquia)	<input type="checkbox"/>
Necesidad de una revisión periódica (al menos anual) por parte de un especialista que incluya la valoración de continuar el tratamiento con topiramato	<input type="checkbox"/>
Necesidad del uso de un método anticonceptivo altamente eficaz o dos métodos complementarios durante el tratamiento y 4 semanas después de la interrupción de topiramato	<input type="checkbox"/>
Importancia de la planificación del embarazo	<input type="checkbox"/>
Importancia de contactar de inmediato con el médico en caso de que la mujer sospeche o conozca que está embarazada	<input type="checkbox"/>
Confirmando que he entregado a la paciente o a su cuidador o persona a cargo una copia de la guía dirigida a la paciente	<input type="checkbox"/>

En caso de embarazo:

Necesidad de monitorización prenatal especializada	<input type="checkbox"/>
<u>Cuando se utiliza para la epilepsia:</u> Evaluación de tratamiento alternativo o cambio de tratamiento	<input type="checkbox"/>
<u>Cuando se utiliza para prevenir la migraña:</u> Importancia de detener inmediatamente el tratamiento.	<input type="checkbox"/>

Nombre del médico

Firma

Fecha
