

ES IMPORTANTE QUE LLEVE ESTA TARJETA CON USTED EN TODO MOMENTO MIENTRAS ESTÉ TOMANDO CIPROTERONA/ ETINILESTRADIOL.

MUESTRE ESTA TARJETA AL PROFESIONAL SANITARIO QUE LE ATIENDA.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaRAM.es>

Interrumpa el tratamiento y acuda a su médico inmediatamente si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas:

- **Dolor intenso o hinchazón en una pierna** que puede ir acompañado de sensibilidad, calor o cambios en el color de la piel, p. ej., si se pone pálida, roja o azul.
- **Dificultad para respirar repentina** sin causa conocida o respiración rápida, tos repentina sin una causa clara (que puede arrastrar sangre).
- **Dolor intenso en el pecho** que puede aumentar al respirar hondo, **dolor agudo en el abdomen** o molestia e la parte superior del cuerpo que puede irradiar a la espalda, la mandíbula, la garganta, el brazo, junto con una sensación de indigestión o ahogo, sudoración, náuseas, vómitos o mareos.

Usted está en tratamiento con un medicamento que contiene acetato de ciproterona y etinilestradiol como principios activos. La toma de este medicamento puede aumentar el riesgo de padecer **coágulos sanguíneos (trombosis)**. Estos coágulos pueden ser graves y, en casos muy raros, incluso mortales.

Es importante que reconozca en qué situaciones es mayor el riesgo de presentar un coágulo sanguíneo, qué signos y síntomas tiene que vigilar y qué medidas tiene que tomar.

Para obtener más información, lea el prospecto del medicamento disponible en www.cima.aemps.es

- **Debilidad o entumecimiento de la cara, brazo o pierna**, especialmente en un lado del cuerpo,
- **Dificultad para hablar** o para comprender, confusión repentina, dolor de cabeza/migraña inusual, mareos.
- **Pérdida repentina de la visión** o visión borrosa, cambios repentinos del olfato, del oído o del gusto.

Recuerde informar a su médico, enfermero o cirujano que está tomando acetato de ciproterona/etinilestradiol si:

- Va a someterse o se ha sometido a una intervención quirúrgica.
- Un profesional sanitario le pregunta si está tomando algún medicamento.

¿En qué situaciones es mayor el riesgo de presentar un coágulo sanguíneo?

- En el primer año de uso de tratamiento (incluso si reinicia el uso después de una interrupción de 1 mes o más).
- Si tiene sobrepeso (índice de masa corporal superior a 30 kg/m²).
- Si tiene más de 35 años.
- Si fuma, especialmente si tiene más de 35 años.
- Si tiene un familiar cercano que haya tenido un coágulo sanguíneo a una edad relativamente temprana (antes de los 50 años).
- Si ha dado a luz en las últimas semanas.
- Si acaba de someterse a una operación.
- Si ha pasado mucho tiempo sin ponerse de pie (p. ej. debido a una lesión o enfermedad, o si tiene la pierna escayolada).
- Si ha hecho un viaje largo (p. ej. un vuelo de larga distancia).

ACETATO DE CIPROTERONA/ ETINILESTRADIOL

TARJETA DE INFORMACIÓN
PARA EL PACIENTE

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) Junio 2025

Disponibile en la web de la AEMPS: www.aemps.gob.es

MA-DIA-ES-0002-1