

- Tras interrumpir el tratamiento, se debe realizar una prueba de embarazo. En el caso de haber usado Alitretinoína o Isotretinoína al mes tras la interrupción del tratamiento. En caso de haber usado Acitretina en intervalos de 1-3 meses durante un periodo de 3 años después de la interrupción del tratamiento.

Recordatorio

No done sangre durante el tratamiento ni durante los 3 años posteriores a la interrupción del mismo si es con Acitretina, o 1 mes si el tratamiento es con Alitretinoína o Isotretinoína.

Este medicamento se le ha recetado únicamente a usted, **no debe dárselo a otras personas.**

Devuelva las cápsulas no utilizadas a la farmacia.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:
<https://www.notificaRAM.es>

PLAN DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS PARA RETINOIDES ORALES (ACITRETINA, ALITRETINOÍNA, ISOTRETINOÍNA)

Tarjeta de información para la paciente

Retinoide/fármaco:

- ACITRETINA
 ALITRETINOÍNA
 ISOTRETINOÍNA

Medicamento (nombre comercial):

.....

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) Junio 2024

Disponible en la página web de la AEMPS
www.aemps.gob.es

Este medicamento no se debe tomar durante el embarazo, puede dañar gravemente al feto si lo toma una mujer embarazada.

Si está embarazada o piensa que puede estarlo, deje de tomarlo inmediatamente y póngase en contacto con su médico.

Lea el prospecto detenidamente antes de iniciar el tratamiento.

Si tiene alguna duda o preocupación sobre su tratamiento, consulte a su médico o farmacéutico.

Qué debe hacer si puede quedarse embarazada:

- **Debe utilizar al menos un método anticonceptivo altamente eficaz** (como un dispositivo intrauterino o un implante anticonceptivo) o usar correctamente dos métodos anticonceptivos eficaces que actúen de forma diferente (por ejemplo, anticonceptivo oral y preservativo) **antes de iniciar el tratamiento, durante el mismo y hasta 3 años después de interrumpirlo en el caso de que utilice un medicamento con Acitretina o bien hasta 1 mes después para medicamentos con Alitretinoína o Isotretinoína.**

- **No debe quedarse embarazada** durante el tratamiento, ni durante los 3 años posteriores a la interrupción del tratamiento con Acitretina, o en el mes posterior, si recibe tratamiento con Alitretinoína o Isotretinoína.

- **Debe acudir a las visitas de seguimiento periódicas y realizarse con regularidad, una prueba de embarazo para asegurarse de que no está embarazada:**

- Antes de iniciar el tratamiento, se debe realizar una prueba de embarazo y obtener un resultado negativo.
- Durante el tratamiento, debe realizarse pruebas de embarazo periódicas, idealmente cada mes.