

AUBAGIO® (TERIFLUNOMIDA): TARJETA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Por favor, muestre esta tarjeta a cualquier médico o profesional sanitario involucrado en el cuidado de su salud (por ejemplo, si acude a Urgencias, a su médico de Atención Primaria...).

**Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Noviembre 2018**

Disponible en la web de la AEMPS: www.aemps.gob.es

SANOFI GENZYME 

Aubagio® (teriflunomida) está indicado en el tratamiento de pacientes adultos con esclerosis múltiple recurrente-remitente.

Este medicamento puede:

- Afectar a la función del hígado.
- Afectar al número de células de la sangre y del sistema inmune.
- Aumentar el riesgo de infecciones que pueden ser graves.
- Causar daños graves en el feto si lo toma durante el embarazo.

En caso de reacción adversa o embarazo, existen formas de acelerar la eliminación de Aubagio® (teriflunomida) de su organismo. Hable con su médico sobre esta posibilidad.

Por favor, lea el prospecto de Aubagio® (teriflunomida) para más información disponible en www.aemps.gob.es.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto.

También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaRAM.es>

Si usted tiene alguno de estos síntomas, por favor, consulte a su médico de inmediato:

- Náuseas inexplicadas.
- Vómitos.
- Su piel o la zona blanca de los ojos se vuelven amarillos.
- Orina de color oscuro.

Si usted es una mujer en edad fértil, no debe estar embarazada antes de comenzar el tratamiento con Aubagio® (teriflunomida).

Su médico le pedirá una prueba de embarazo antes de prescribirle Aubagio® (teriflunomida). Adicionalmente, es muy importante que utilice un método anticonceptivo eficaz acordado con su médico durante el tratamiento y después, hasta que se haya eliminado el medicamento de su organismo (este medicamento permanece mucho tiempo en su cuerpo después de interrumpir el tratamiento. Consulte a su médico antes de quedarse embarazada, incluso si hace tiempo [hasta 2 años] que dejó de tomarlo).

Aubagio® (teriflunomida) no afecta a la eficacia de los anticonceptivos hormonales orales. Debe informar a su médico antes de cambiar o suspender las medidas anticonceptivas. Si hay alguna posibilidad de que esté embarazada, por favor, póngase en contacto con su médico inmediatamente.

Debe tratar con su médico si tiene previsto o está realizando lactancia materna. No debe dar el pecho a su hijo durante el tratamiento con Aubagio® (teriflunomida).

Antes y durante el tratamiento le controlarán la tensión arterial y le harán análisis de sangre periódicamente. Estos controles son importantes para su seguridad. Por favor, asegúrese de llevar consigo en cada visita a un profesional sanitario una lista con todos sus tratamientos y problemas de salud.

Nombre: _____

Fecha de la primera prescripción de Aubagio® (teriflunomida): _____ / _____ / _____

Centro: _____

Nombre de su médico: _____

Teléfono de su médico: _____