

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaram.es>

Disponible en la web de la AEMPS: www.aemps.gob.es

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) enero 2019

TARJETA DE INFORMACIÓN DIRIGIDA A PACIENTES CON ENFERMEDAD DE STILL QUE SE ENCUENTRAN EN TRATAMIENTO CON KINERET[®]

Nombre del paciente:

Nombre del cuidador (para los niños):

Dosis del paciente:

Nombre y número de teléfono del médico:

Importante información de seguridad sobre la enfermedad de Still

El síndrome de activación macrofágica (SAM) es una complicación grave de la enfermedad de Still. Si no se trata, el SAM puede poner en peligro su vida. El riesgo de desarrollar un SAM aumenta si tiene una infección o si los síntomas de la enfermedad de Still están mal controlados.

Los síntomas del SAM pueden ser: fiebre alta que no cede, inflamación de los ganglios linfáticos y/o erupción persistente en la piel.

Kineret® (anakinra) puede aumentar el riesgo de sufrir una infección grave.

Los síntomas de una infección pueden ser: fiebre alta que no cede, temblores, tos, dolor de cabeza y enrojecimiento y/o dolor en la piel.

Otros posibles signos de infección son: fiebre baja de duración prolongada, pérdida de peso y tos persistente.

Si desarrolla signos de infección o se produce un empeoramiento de los síntomas de la enfermedad de Still, póngase en contacto con su médico lo antes posible.