

Nombre del paciente:

Fecha de la primera prescripción de JINARC®:

Nombre del médico:

Nombre del centro de tratamiento:

Número de contacto del centro de tratamiento:

OPS/A/0319/JIN/1173



▼ JINARC® (tolvaptán)

Tarjeta de información para el paciente

Esta tarjeta contiene información importante de seguridad que usted debe tener en cuenta.

Lleve esta tarjeta con usted en todo momento y muéstresela a cualquier médico que participe en su tratamiento, no sólo al médico especialista que se lo ha prescrito.

- ▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante comunicar los efectos adversos que pudiera usted tener. Puede consultar la forma de hacerlo en el prospecto del medicamento.

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), marzo 2019

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es

Información sobre seguridad importante para los pacientes.

JINARC® puede afectar al funcionamiento de su hígado. Consulte a su médico si experimenta síntomas de cansancio, pérdida de apetito, molestias en la parte alta del abdomen, oscurecimiento de la orina o amarilleamiento de la piel o de los ojos, deshidratación severa, náuseas, vómitos, picor en la piel, dolor articular o muscular.

JINARC® puede causar una deshidratación grave.

Beba líquidos (excepto zumo de pomelo) en cantidad abundante para evitar deshidratarse y consulte a su médico si tiene algún tipo de dificultad para ello (por ejemplo, dificultad para tragar).

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto.

También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaram.es>

Información sobre seguridad importante para personal de Urgencias.

JINARC® puede causar daños hepáticos. Deberá verificarse de manera periódica la función hepática del paciente (mensualmente durante los primeros 18 meses y trimestralmente a partir de ese momento).

JINARC® bloquea la acción de la vasopresina en el riñón y puede causar la producción de grandes volúmenes de orina, así como deshidratación grave.

Si desea obtener más información, consulte la ficha técnica de este medicamento.