



TARJETA DE INFORMACIÓN PARA EL **PACIENTE DE SIMPONI**

Nombre del paciente:

Nombre del médico:

Teléfono del médico:

1 INFECCIONES

Durante el tratamiento con Simponi, podría llegar a contraer infecciones más fácilmente. Las infecciones podrían progresar rápidamente y llegar a ser graves. Es posible también que algunas infecciones que haya sufrido previamente puedan volver a aparecer.

1.1 Antes de comenzar el tratamiento con Simponi:

- Informe a su médico si tiene una infección. No debe ser tratado con Simponi si presenta tuberculosis (TB) o cualquier otra infección grave.
- Se debe realizar las pruebas de detección de TB. Es muy importante que informe a su médico si alguna vez ha tenido TB, o si ha estado en contacto cercano con alguien que haya tenido TB.

Solicite a su médico que anote el tipo y la fecha de la(s) última(s) prueba(s) de detección de TB:

Prueba	<input type="text"/>	Prueba	<input type="text"/>
Fecha	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	Fecha	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
Resultado	<input type="text"/>	Resultado	<input type="text"/>

- Informe a su médico si conoce o sospecha que es portador del virus de hepatitis B.

1.2 Durante el tratamiento con Simponi y una vez que éste haya finalizado:

- Si nota síntomas que sugieren que puede estar teniendo una infección, como por ejemplo: fiebre, cansancio, tos (persistente), dificultad al respirar, o síntomas pseudogripales, pérdida de peso, sudoración nocturna, diarrea, heridas, problemas dentales y una sensación de quemazón al orinar, se debe poner en contacto con su médico inmediatamente.

2 EMBARAZO Y VACUNAS

En caso de que haya recibido Simponi durante el embarazo, es importante que informe de esto al médico de su bebé antes de que su bebé sea vacunado.

No debe vacunar a su bebé con una “vacuna viva”, como la BCG (utilizada para prevenir la tuberculosis) en los 6 meses después de su última inyección de Simponi durante el embarazo.

3 FECHAS DE ADMINISTRACIÓN DEL TRATAMIENTO CON SIMPONI

1ª administración:

 / /

Administraciones posteriores:

 / / / / / /

Es importante que usted y su médico anoten el nombre comercial y el número de lote de su medicamento.

4 OTRA INFORMACIÓN

- Cuando vaya al médico, asegúrese también de llevar anotados todos los demás medicamentos que esté usando.
- Guarde esta tarjeta durante 6 meses desde la última dosis de Simponi, ya que los efectos adversos se pueden producir mucho tiempo después de la última dosis de Simponi.
- Lea detenidamente el prospecto de Simponi antes de empezar a usar este medicamento.

Esta Tarjeta de Información para el Paciente contiene información de seguridad importante que necesita conocer antes y durante el tratamiento con Simponi.

Muestre esta tarjeta a cualquier médico que le esté tratando.

