

Análisis de sangre para controlar la función hepática

Se han detectado anomalías en las pruebas sanguíneas de función hepática en algunos pacientes que estaban tomando STAYVEER. Durante el tratamiento con STAYVEER, su médico programará análisis de sangre regulares para vigilar los cambios que se pudieran producir en su función hepática.

→ **Recuerde que deben realizarle un análisis de sangre para controlar su función hepática cada mes. Después de aumentar la dosis, le realizarán un análisis adicional al cabo de 2 semanas.**

Fecha del primer análisis mensual:

Calendario mensual de análisis de sangre para controlar la función hepática:

Enero	Febrero	Marzo	Abril
Mayo	Junio	Julio	Agosto
Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

STAYVEER[®] bosentan **Alertas Importantes de Seguridad para pacientes tratados con STAYVEER (bosentan)**

Esta tarjeta contiene información importante sobre STAYVEER. Por favor lea esta tarjeta detenidamente antes de empezar el tratamiento con STAYVEER.

Su nombre:
Médico prescriptor:

Si tiene preguntas sobre STAYVEER pregunte a su médico.

Janssen-Cilag International NV

Si es una mujer en edad de tener hijos lea detenidamente esta página

Embarazo

STAYVEER puede dañar el desarrollo del feto. Por lo tanto, no debe tomar STAYVEER si está embarazada y tampoco debe quedarse embarazada mientras esté tomando STAYVEER.

Además, si padece hipertensión pulmonar, debe saber que el embarazo puede empeorar gravemente los síntomas de su enfermedad. Si sospecha que puede estar embarazada, dígaselo a su médico o ginecólogo.

21595221

Anticoncepción

Los métodos anticonceptivos hormonales tales como los anticonceptivos orales, las inyecciones de hormonas, los implantes, o los parches transdérmicos, no previenen de forma segura el embarazo en las mujeres que están siendo tratadas con STAYVEER. Para impedir el embarazo necesita usar un método de barrera – como un preservativo, diafragma o esponja vaginal – junto con cualquiera de los métodos anticonceptivos hormonales disponibles. Asegúrese de comentar cualquier duda que pueda tener con su médico o ginecólogo – complete el cuestionario que se incluye en el reverso de esta tarjeta y entrégueselo a su médico o ginecólogo en la próxima visita.

Debe hacerse una prueba de embarazo antes de iniciar el tratamiento con STAYVEER y cada mes durante todo el tiempo que dure el tratamiento incluso aunque piense que no está embarazada.

Fecha de la primera prueba de embarazo mensual:

Anticoncepción

Utiliza o toma anticonceptivos actualmente?

Sí No

En caso afirmativo, escriba los nombres aquí:

Entregue esta tarjeta a su médico o ginecólogo en la próxima visita y él/ella podrán aconsejarle si necesita usar métodos anticonceptivos adicionales o alternativos