


Aplique LEDAGA inmediatamente o en los 30 minutos posteriores de sacarlo de la nevera.




Abra la bolsa de plástico, saque LEDAGA de la caja de cartón y abra el tubo. Antes del primer uso, utilice el tapón para perforar el precinto. No utilice el producto si no hay precinto o si está dañado.




Paciente

Aplique una fina capa del medicamento sobre la piel completamente seca al menos 4 horas antes o 30 minutos después de ducharse o asearse.




Cuidador

Los cuidadores deben llevar guantes de nitrilo desechables (a modo de protección) antes de aplicar una fina capa sobre la piel completamente seca. Tras la aplicación, se deben quitar los guantes dándoles la vuelta para evitar el contacto con LEDAGA.




Deje secar el gel (5-10 minutos) antes de cubrir la zona con la ropa. No utilice vendajes oclusivos. LEDAGA es inflamable. Evite el contacto con una llama viva o con un cigarrillo encendido hasta que el producto esté seco. No utilice productos cutáneos en las 2 horas anteriores o posteriores a la aplicación.


Paciente y
cuidador



Inmediatamente después de la aplicación,
lávese las manos con agua y jabón.



Con las manos limpias, cierre el tubo, vuelva
a colocarlo en su caja y en la bolsa de plástico
transparente con cierre.



Guarde la bolsa de plástico transparente
con cierre en la nevera. Manténgala fuera
del alcance de los niños.

En caso de que LEDAGA entre en contacto directo con la piel en personas que no sean los pacientes, lávese la zona con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Quítese y lave la ropa contaminada y póngase en contacto con su médico. En caso de exposición en zonas de piel no afectadas del paciente, el paciente se debe lavar la zona con agua y jabón. La bolsa de plástico transparente con cierre suministrada con LEDAGA, diseñada para prevenir la exposición secundaria y las contaminaciones, dispone de un mecanismo de seguridad para niños. No tire ningún producto sanitario ni los guantes de nitrilo utilizados para la aplicación y pregunte a su farmacéutico.

Instrucciones para el paciente y el cuidador

LEDAGA® 160 microgramos/g
Gel
Clormetina

0204493321 41372

HELSINN