

ILUVIEN® INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Código QR

Lea estos materiales conjuntamente con el Prospecto del producto disponible en www.aemps.gob.es

La inyección puede causar una infección dentro del ojo denominada endoftalmitis.

Contacte con su médico de inmediato si experimenta alguno de los siguientes signos/síntomas de inflamación/infección en el ojo:

- Visión borrosa o disminución de la visión
- Dolor en el ojo
- Empeoramiento del enrojecimiento del ojo
- Sensación de pequeñas partículas o manchas en la visión (moscas volantes)
- Aumento de la sensibilidad a la luz tras la inyección

ILUVIEN también puede causar cambios en la retina.

Contacte con su médico de inmediato si experimenta:

- Destellos
- Impedimento visual parcial

La inyección también puede causar:

- Aumento de la presión intraocular
- Opacidad del cristalino (catarata)

Es importante asistir a las visitas programadas con su médico para que pueda hacerle un seguimiento periódico.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto.

También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaram.es>

Doctor/a

Teléfono

También puede comunicar los efectos adversos a BRILL PHARMA, S.L. por email, notificacion@brillpharma.com o por teléfono 93 417 09 11.

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Fecha de revisión: Diciembre 2019

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es