

Asegúrese de tener una lista de todos sus medicamentos cuando consulte a un profesional sanitario.



Consulte a su médico o enfermero si tiene alguna pregunta sobre la información en esta tarjeta.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacológico de medicamentos de Uso Humano:

<https://www.notificaRAM.es>

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Julio 2020

Disponible en la web de la AEMPS
www.aemps.gob.es

Tarjeta de información al paciente para indicaciones no oncológicas **RITUXIMAB**

¿Por qué me han dado esta tarjeta?

Este medicamento puede aumentar la probabilidad de contraer infecciones.

Esta tarjeta le informa de lo siguiente:

- Lo que necesita saber antes de recibir rituximab.
- Cuáles son los signos de una infección.
- Qué hacer si cree que podría estar contrayendo una infección.

También incluye su nombre y el nombre y número de teléfono del médico en la parte posterior.

¿Qué debo hacer con esta tarjeta?

- Lleve siempre con usted esta tarjeta, por ejemplo, en su billetera o cartera.
- Muestre esta tarjeta a cualquier médico, enfermero o dentista que consulte, no únicamente al especialista que le recete rituximab.

Mantenga esta tarjeta con usted durante 2 años después de su última dosis de rituximab. Esto se debe a que se pueden desarrollar efectos adversos varios meses después de haber recibido el tratamiento.

¿Cuándo no debería recibir rituximab?

Si tiene una infección activa o un problema grave con su sistema inmunológico.

Informe a su médico o enfermero si está tomando o ha tomado previamente medicamentos que pueden afectar a su sistema inmunológico, incluida la quimioterapia.

¿Cuáles son los signos de contraer una infección?

Esté atento a los siguientes signos posibles de infección:

- Fiebre o tos todo el tiempo.
- Pérdida de peso.
- Dolor sin haberse herido.
- Sentirse generalmente mal o apático.

Si tiene alguno de estos signos, informe a un médico o enfermero inmediatamente.

También debe informarles sobre su tratamiento con rituximab.

¿Qué más necesito saber?

En raras ocasiones, rituximab puede causar una infección cerebral grave llamada "leucoencefalopatía multifocal progresiva" o LMP. Esto puede ser mortal.

Los signos de LMP incluyen:

- Confusión, pérdida de memoria o dificultades para pensar.
- Pérdida del equilibrio o un cambio en la forma de caminar o hablar.
- Disminución de la fuerza o debilidad en un lado de su cuerpo.
- Visión borrosa o pérdida de visión.

Si tiene alguno de estos signos, informe a un médico o enfermero inmediatamente.

También debe informarles sobre su tratamiento con rituximab.

¿Dónde puedo obtener más información?

Consulte el prospecto para obtener más información.

Fecha de inicio del tratamiento y datos de contacto

Fecha de la perfusión más reciente:

.....

Fecha de la primera perfusión:

.....

Nombre del paciente:

.....

Nombre del médico:

.....

Datos de contacto del médico:

.....

Nombre Comercial:

.....