

## PARA PROFESIONALES SANITARIOS

Este paciente está en tratamiento con pegvaliasa. El uso de este medicamento se ha asociado a reacciones alérgicas graves.

**Para más información sobre pegvaliasa, consulte su Ficha Técnica.**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto.

También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:

<https://www.notificaRAM.es>.

# Tarjeta de información para el paciente ▼ Palynziq® (pegvaliasa)

**IMPORTANTE: Lleve siempre consigo un dispositivo de inyección de adrenalina y esta tarjeta. Enseñe la tarjeta a cualquier profesional que le preste atención sanitaria incluso en caso de emergencia.**

**Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Septiembre 2020**

Disponible en la web de la AEMPS, [www.aemps.gob.es](http://www.aemps.gob.es)

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante comunicar los efectos adversos que pudiera usted tener. Puede consultar la forma de hacerlo en el prospecto del medicamento.

Nombre del paciente: \_\_\_\_\_

Fecha de la primera inyección: \_\_\_\_\_

Información sobre alergias: \_\_\_\_\_

Otros problemas de salud (como asma): \_\_\_\_\_

Nombre de contacto en caso de emergencia: \_\_\_\_\_

Teléfono de contacto en caso de emergencia: \_\_\_\_\_

Nombre del médico: \_\_\_\_\_

Teléfono de contacto del médico: \_\_\_\_\_

Hospital/Centro médico: \_\_\_\_\_

Información de contacto del médico fuera del horario de consulta: \_\_\_\_\_

**Palynziq puede causar reacciones alérgicas graves que pueden ser potencialmente mortales** y que pueden producirse en cualquier momento después de una inyección.  
**Interrumpa la administración de Palynziq si aparece alguno de los siguientes síntomas:**

**Los síntomas de una reacción alérgica grave pueden ser, entre otros, los siguientes:**

- hinchazón de la cara, los ojos, los labios, la boca, la garganta, la lengua, las manos y/o los pies
- dificultad para respirar o sibilancias (“pitos” al respirar)
- opresión en la garganta o sensación de atragantamiento
- dificultad para tragar o para hablar
- sensación de mareo o desmayo
- pérdida de orina o de heces
- latido cardíaco rápido
- urticaria (como una erupción cutánea con bultos que pica) que se extiende rápidamente
- rubor (ponerse colorado)
- calambre o dolor de estómago intenso, vómitos o diarrea

**Qué hacer si experimenta una reacción alérgica grave**

- Interrumpa la administración de Palynziq
- Utilice su dispositivo de adrenalina
- Solicite asistencia médica inmediatamente o acuda al servicio de urgencias más próximo