

Qué hacer si experimenta una reacción alérgica grave

- Interrumpa la administración de PALYNZIQ
- Utilice su dispositivo de adrenalina
- Solicite asistencia médica inmediatamente o acuda al servicio de urgencias más próximo

PARA PROFESIONALES SANITARIOS

Este paciente está en tratamiento con pegvaliasa. El uso de este medicamento se ha asociado a reacciones de hipersensibilidad sistémica aguda y angioedema graves. Para más información sobre pegvaliasa, consulte su ficha técnica.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto.

También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaRAM.es>
Incluya el número de lote de su medicamento en la notificación.

v2.0 Octubre 2024

EUCAN-PAL-00154 Octubre 2024

Tarjeta de información para el paciente PALYNZIQ (pegvaliasa)

IMPORTANTE: Lleve siempre consigo un dispositivo de inyección de adrenalina y esta tarjeta. Muestre esta tarjeta a cualquier profesional que le preste atención sanitaria incluso en caso de emergencia.

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS). Fecha de revisión: Octubre 2024

Disponible en la web de la AEMPS, www.aemps.gob.es

Nombre del paciente: _____

Fecha de la primera inyección: _____

Información sobre alergias: _____

Otros problemas de salud (como asma): _____

Nombre de contacto en caso de emergencia: _____

Teléfono de contacto en caso de emergencia: _____

Nombre del médico: _____

Teléfono de contacto del médico: _____

Hospital/Centro médico: _____

PALYNZIQ puede causar reacciones alérgicas graves que pueden ser potencialmente mortales y que pueden producirse en cualquier momento después de una inyección.

Interrumpa la administración de PALYNZIQ si aparece alguno de los siguientes síntomas:

- Hinchazón de la cara, los ojos, los labios, la boca, la garganta, la lengua, las manos y/o los pies
- Pérdida de orina o de heces
- Dificultad para respirar o sibilancias ("pitos" al respirar)
- Latido cardíaco rápido
- Opresión en la garganta o sensación de atragantamiento
- Urticaria (como una erupción cutánea con bultos que pica) que se extiende rápidamente
- Dificultad para tragar o para hablar
- Rubor (ponerse colorado)
- Sensación de mareo o desmayo
- Calambre o dolor de estómago intenso, vómitos o diarrea