



TARJETA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE ▼DAURISMO® (glasdegib)

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Noviembre 2020

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante comunicar los efectos adversos que pudiera usted tener. Puede consultar la forma de hacerlo en el prospecto del medicamento.

Tal y como le ha explicado su médico, la presencia de Daurismo en el semen puede causar graves malformaciones e incluso la muerte del feto. Por ello, y con el fin de evitar el embarazo **los pacientes varones deben:**

- **Usar siempre un preservativo (preferiblemente con espermicida)** en sus relaciones sexuales con mujeres durante el tratamiento y durante al menos 30 días después haber tomado la última dosis.
- **No donar semen** durante el tratamiento ni durante los 30 días posteriores a la administración de la última dosis.
- **Ponerse en contacto con su médico inmediatamente si su pareja se queda embarazada** (o aunque sólo piensen que pueden estarlo) mientras está tomando Daurismo o durante los 30 días posteriores a la administración de la última dosis.
- **Pedir asesoramiento sobre la preservación eficaz de la fertilidad** antes de iniciar el tratamiento con este medicamento.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es