

¿Cuándo debe usar Nyxoid?

Si el paciente tiene signos de sospecha de sobredosis por opioides como:

- Problemas para respirar.
- Somnolencia extrema (fuerte sensación de sueño).
- No responde a un ruido fuerte o al tacto.

Llame inmediatamente a los servicios de urgencias médicas y pida una ambulancia, incluso si la persona se despierta, ya que puede volver a quedarse inconsciente y dejar de respirar.

Tenga cuidado: una persona tratada con este medicamento puede mostrar síntomas de síndrome de abstinencia agudo y en algunas ocasiones, un comportamiento agresivo al despertar, lo cual puede ser peligroso.

Comunicación de sospechas de efectos adversos.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:

<https://www.notificaRAM.es>

Si necesita información adicional lea el prospecto que se encuentra en el interior de la caja. Puede escanear este código QR para ver el video con las instrucciones de uso.



Este video también se encuentra disponible en el siguiente enlace de la AEMPS:

<https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=1171238001>

Para conocer las instrucciones completas, lea atentamente toda la información contenida en esta guía.



C Sujete la pierna que está más alejada de usted por encima de la rodilla y levante esta rodilla.

Gire de lado a la persona hacia usted. Apoye su cabeza, manteniendo la parte posterior (dorso) de la mano contra la mejilla.



D Posición final: La mano de la persona sujeta su propia cabeza y su pierna superior queda doblada por la rodilla.

5 Observe al paciente hasta que llegue la ambulancia

Permanezca con el paciente. Esté pendiente por si se produce mejoría en la respiración o en la respuesta al sonido o al tacto.

Si la persona se encuentra inconsciente y respira de forma irregular, proceda a realizar soporte vital básico (como RCP) si usted ha sido instruido previamente para ello*.

Esté atento - incluso si el paciente se despierta, puede volverse a quedar inconsciente y dejar de respirar.

6 ¿No hay respuesta? Administre la 2ª dosis

Si no hay mejoría tras 2-3 minutos, o si vuelven los síntomas de sobredosis: **use un nuevo pulverizador nasal en la otra fosa nasal.**

Puede realizar esto mientras la persona permanece en la posición de recuperación (descrita en el punto 4).

*Para más información sobre la formación en soporte vital básico, diríjase al Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar <http://www.cercp.org/>

7 Vele por su propia seguridad

Si la persona muestra dependencia a los opioides, Nyxoid puede producir síntomas del síndrome de abstinencia agudo. Los síntomas pueden incluir:

- Dolores corporales y calambres
- Vómitos, náuseas, diarrea
- Fiebre, moqueo o estornudos
- Sudoración, escalofríos o temblores
- Nerviosismo o irritabilidad.

Algunas personas puede parecer que actúan de forma agresiva al despertarse.

¡Vele por su propia seguridad!

8 En el momento en el que la ambulancia llegue

Informe inmediatamente al médico y/o enfermero sobre lo ocurrido y que ha administrado Nyxoid. Entrégueles todo pulverizador nasal utilizado.

Eliminación de los pulverizadores nasales utilizados.

Si se olvida de entregar los pulverizadores nasales utilizados al médico y/o enfermero, entrégueselos a su farmacéutico u otro profesional sanitario, y pida pulverizadores nuevos. Nunca debe tirar los pulverizadores a un contenedor ni a la basura.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD DIRIGIDA AL PACIENTE, SUS CUIDADORES Y FAMILIARES NYXOID (NALOXONA)



NYXOID
naloxona

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Mayo 2021.

Disponible en la página web de la AEMPS:

www.aemps.gob.es

En la parte posterior de cada blíster encontrará una guía rápida de uso.

¿Qué es Nyxoid?

Nyxoid es un pulverizador nasal unidosis (de una sola dosis) que se utiliza para el tratamiento de urgencia de la sobredosis por opioides (como heroína, metadona, fentanilo, oxycodona, buprenorfina y morfina).

Cada envase contiene 2 pulverizadores nasales (2 dosis).

Nyxoid actúa durante un periodo corto de tiempo y no sustituye la atención médica de urgencia.

Cualquier persona en riesgo de sobredosis por opioides debe llevar consigo este medicamento. Los cuidadores, familiares cercanos o amigos del paciente, deben saber dónde encontrar este pulverizador en caso de urgencia.

Anote la fecha de caducidad del medicamento y sustituya el envase un mes antes de que caduque.

Puede programar una alarma en su calendario para que le avise 1 mes antes de que el medicamento vaya a caducar y acudir a su médico o farmacéutico para sustituirlo por uno nuevo.

Lea estos materiales conjuntamente con el prospecto de Nyxoid disponible en www.aemps.gob.es. La ficha técnica y el prospecto completo se encuentran en el Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS (CIMA) a través del enlace <https://cima.aemps.es>

1 Compruebe si hay signos de sobredosis

2 Llame a una ambulancia (112) 

3 Tumbé al paciente e incline su cabeza hacia atrás y administre **Nyxoid** en un agujero de la nariz (en una fosa nasal) 

4 Coloque al paciente en posición de recuperación 

5 Quédense con el paciente y obsérvelo hasta que llegue la ambulancia

6 Administre la 2ª dosis si no hay mejoría en 2-3 minutos o si vuelven los síntomas de sobredosis

7 Vele por su propia seguridad: esté pendiente de si hay síntomas de síndrome de abstinencia agudo y/o comportamiento agresivo del paciente

8 Deshágase de los pulverizadores utilizados

1 Compruebe si hay signos de sobredosis

Aproxímese al paciente con cuidado.

Revise que no existen riesgos como, por ejemplo, materiales para inyección (jeringuillas, agujas...) tirados alrededor de la persona.

Compruebe si hay respuesta, para ver si la persona está consciente. Usted puede:

- Gritar su nombre.
- Agitarle los hombros suavemente.
- Hablarle alto al oído.
- Frotarle el hueso del centro del pecho (esternón).
- Pellizcarle la oreja o el dedo en la base de la uña.

Compruebe las vías respiratorias y la respiración.

- Retire de la boca o de la nariz cualquier cosa que le esté bloqueando.
- Compruebe la respiración durante 10 segundos.
¿Se mueve el pecho?
¿Puede oír sonidos de respiración?.

Compruebe si hay signos de sobredosis, como:

- Ausencia de respuesta al tacto o el sonido.
- Respiración lenta e irregular o ausencia de respiración.
- Ronquidos, jadeos o atragantamiento.
- Uñas o labios morados o azules.

2 Llame a una ambulancia, (Servicio de Urgencias Médicas) 

Siempre debe llamar inmediatamente a los servicios de urgencia, incluso si la persona se despierta.

Nyxoid no es un sustituto de la atención médica de urgencia ni del soporte vital básico como Reanimación Cardiopulmonar (RPC).

Ponga su teléfono en modo manos libres si es posible, para tener las manos desocupadas.

Aporte toda la información que le sea posible a los servicios de urgencia, incluyendo:

- Donde se encuentra exactamente (la dirección).
- Las sustancias que usted cree que la persona ha podido administrarse.
- Si la persona está consciente y respira.
- Que usted pretende administrarle Nyxoid pulverizador nasal.


3 Administre 1 pulverizador nasal de Nyxoid



Saque el blíster del envase. Despegue la parte posterior del blíster por una esquina y saque el pulverizador nasal. Colóquelo en un lugar de fácil acceso.



Tumbé a la persona boca arriba. Sujete el cuello por la parte posterior permitiendo que la cabeza se incline hacia atrás. Despeje su nariz de cualquier cosa que la esté bloqueando.



No presione el émbolo aún

Sujete el pulverizador nasal según se muestra en la imagen - coloque los dedos índice y corazón a ambos lados de la boquilla y sitúe el dedo pulgar en la parte inferior del émbolo de forma que quede listo para presionar.

No presione el dispositivo para cebar o probar antes de su uso porque la única dosis que contiene se perderá.



Presione el émbolo

Introduzca suavemente la boquilla del dispositivo en una de las fosas nasales. Presione con firmeza el émbolo hasta que haga clic para administrar la dosis. Retire la boquilla del pulverizador de la fosa nasal. Trate de recordar la fosa nasal en la que ha realizado la administración.

4 Coloque al paciente en posición de recuperación



A Coloque el brazo del paciente más próximo a usted en ángulo recto respecto al cuerpo y dóbleselo.



B Sitúe el otro brazo del paciente sobre el pecho con el dorso de su mano contra la mejilla.