

Datos de contacto

Nombre del paciente:

Persona de contacto en caso de urgencia (Nombre y teléfono)

Teléfono de contacto del prescriptor Venclyxto:

Lleve siempre consigo esta tarjeta y muéstrela a todos los profesionales sanitarios que le presten atención médica.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaRAM.es>

BCL2-ES-00001-D

abbvie



Información de seguridad dirigida a los **Profesionales sanitarios** en relación con el SLT

Este paciente está tomando Venclyxto® para su LLC por lo que podría sufrir un Síndrome de Lisis Tumoral (SLT) durante las 5 primeras semanas de tratamiento.

- Evalúe niveles de: potasio, ácido úrico, fósforo, calcio y creatinina.
- Corrija urgentemente las alteraciones que se produzcan ya que **si no se tratan, podrían llegar a ser fatales.**
- Ante la sospecha de un SLT, contacte inmediatamente con el médico prescriptor que aparece en esta tarjeta.

Por favor consulte la Ficha técnica o contacte con Abbvie a través del número 91 384 09 10 para más información y si necesita copias adicionales de esta tarjeta.

Tarjeta de información para el paciente

Venclyxto se utiliza para tratar a pacientes con LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA (LLC). Esta tarjeta contiene información que necesita saber acerca del Síndrome de lisis tumoral y Venclyxto®.



- Lleve consigo esta tarjeta en todo momento.
- Muéstresela a cualquier médico implicado en su asistencia sanitaria o si acude a urgencias.
- Tome Venclyxto exactamente como su médico le haya indicado.

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Julio 2021.

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es

▼ *Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante comunicar los efectos adversos que pudiera usted tener. Puede consultar la forma de hacerlo en el prospecto del medicamento.*

¿Qué debe conocer acerca del SLT?

Durante su tratamiento con Venclyxto, podrían elevarse en sangre determinados parámetros analíticos (como por ejemplo el potasio y el ácido úrico). Esto podría conducir a un cuadro clínico denominado Síndrome de Lisis Tumoral (SLT) durante las 5 primeras semanas de tratamiento.

Síntomas del SLT:

- Fiebre o escalofríos
- Náuseas o vómitos
- Sensación de confusión
- Sensación de falta de aire
- Latidos irregulares del corazón, palpitaciones.
- Orina oscura o turbia
- Sensación inusual de cansancio
- Dolor muscular o articular
- Convulsiones
- Dolor o hinchazón abdominal

¿Qué debo hacer si tengo síntomas de SLT?

Si presenta síntomas de SLT durante su tratamiento, debe:

- ! **Llamar a su médico y pedir Atención médica inmediatamente, y**
- ! **Dejar de tomar Venclyxto®**

Para más información de Venclyxto® consulte su prospecto y la presente tarjeta en <https://cima.aemps.es/cima/publico/lista.html>

¿Cómo reduzco el riesgo de tener un SLT?

Beba entre **1,5 a 2 litros de agua diarios**:

- Empezando dos días antes de tomar la primera dosis, de Venclyxto y
- El día de su primera dosis, y
- Cada día durante las 5 primeras semanas de tratamiento. Beber mucha agua le ayudará a eliminar los niveles altos de algunas sales en su orina.

Acuda a las **citas de las analíticas** que le hayan programado, ya que ayudarán a su médico a identificar un posible SLT.

Antes de iniciar su tratamiento con Venclyxto®, es posible que su médico le haya recetado algún medicamento para prevenir el incremento de los niveles de ácido úrico en sangre, si es así, tómelo tal y como él le haya indicado.