

# **PEDIATRIA**

## **Tarjeta de información para el paciente**

### **Adalimumab**

Muestre esta tarjeta a todos los profesionales sanitarios que presten atención médica a su hijo.

No todos los efectos adversos posibles están recogidos en esta tarjeta. Lea el prospecto de adalimumab o hable con el médico de su hijo para obtener más información sobre los efectos adversos.

**Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Fecha de revisión: junio 2019.**

**Esta tarjeta contiene información importante de seguridad que usted debe conocer antes y durante el tratamiento de su hijo con adalimumab.**

- Lleve la tarjeta siempre con usted mientras dure el tratamiento de su hijo con adalimumab y hasta 4 meses después de la última inyección.
- Muestre esta tarjeta a los médicos que estén tratando a su hijo.
- Anote la información relativa a las pruebas o tratamientos para tuberculosis que su hijo haya tenido en la parte posterior de esta tarjeta.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:

<https://www.notificaRAM.es>

## **Antes de comenzar el tratamiento con adalimumab**

Informe al médico de su hijo sobre cualquier problema de salud que tenga y cualquier medicamento que esté tomando su hijo. Esta información les ayudará a decidir si el tratamiento con adalimumab es adecuado para su hijo.

Informe al médico de su hijo si este:

- Tiene una infección o tiene síntomas de infección (como por ejemplo fiebre, heridas, cansancio o problemas dentales).
- Tiene tuberculosis o ha estado en contacto con alguien que la haya tenido.
- Tiene o ha tenido, cáncer.
- Tiene adormecimiento, hormigueos o tiene un problema que afecta al sistema nervioso central de su hijo, como esclerosis múltiple.

- El médico de su hijo buscará signos y síntomas de tuberculosis antes de iniciar el tratamiento con adalimumab. Su hijo puede necesitar tratamiento para la tuberculosis antes de comenzar a usar adalimumab.

### **Vacunaciones**

El médico puede sugerir que su hijo reciba ciertas vacunas antes de que empiece el tratamiento con adalimumab. Las vacunas vivas no deben administrarse mientras esté tomando este medicamento. Si la madre del niño recibe Adalimumab durante el embarazo, es importante que informe al médico del bebé antes de recibir cualquier vacuna. El bebé no puede vacunarse con “microorganismos vivos” como la BCG (para prevenir la tuberculosis) durante los 5 meses siguientes a la última inyección de adalimumab en el embarazo.

### **Durante el tratamiento con Adalimumab**

Informe a su médico de inmediato sobre cualquier cambio en la enfermedad de su hijo y hasta 4 meses después de la última inyección de adalimumab.

Es importante llamar al médico de inmediato ante cualquier síntoma inusual que su hijo pueda tener.

Infórmele sobre cualquier enfermedad nueva que hayan diagnosticado a su hijo, y sobre los nuevos medicamentos que esté tomando. Asimismo, comuníquelo cualquier cirugía planeada.

## **Síntomas que pueden aparecer en su hijo durante el tratamiento con adalimumab**

Con el tratamiento con adalimumab, su hijo, podría contraer infecciones con más facilidad. Informe inmediatamente a su médico si su hijo presenta: fiebre, escalofríos, sudoración inusual, se siente mal o más cansado de lo normal, náuseas o vómitos, diarrea, dolor de estómago, pérdida de apetito o pérdida de peso, tos o tos con sangre o moco, dificultad para respirar, problemas para orinar, llagas en la piel, heridas, dolores musculares, problemas dentales.

En muy raras ocasiones se han dado casos de ciertos tipos de cáncer en niños y adultos tratados con adalimumab. Informe a su médico inmediatamente si su hijo tiene: sudores nocturnos, inflamación de los ganglios linfáticos (glándulas inflamadas) en el cuello, las axilas, la ingle u otras áreas; pérdida de peso; nuevas lesiones en la piel o cambios en las lesiones en

la piel (como lunares o pecas) que ya tiene; picor importante que no se puede explicar.

Asimismo contacte inmediatamente con el médico si su hijo presenta: entumecimiento u hormigueo, cambios en la visión, debilidad muscular o mareos inexplicables.

Si presenta estos síntomas u otros efectos adversos, informe a su médico o busque atención médica inmediatamente.

**Nombre de su hijo:**

---

---

**Nombre del médico de su hijo  
(que recetó adalimumab):**

---

---

**Teléfono del médico de su hijo:**

---

**Fecha de la primera inyección de  
adalimumab de su hijo:**

---

**Dosis de la inyección de  
adalimumab de su hijo:**

---

**Fecha de la última inyección de  
adalimumab de su hijo  
(si ya no se le administra adalimumab):**

---

## Pruebas y tratamiento de Tuberculosis (TB)



Marque esta casilla si alguna vez su hijo se ha realizado las pruebas de la TB:

SI



(compruébelo con el médico de su hijo si no lo sabe)



Marque esta casilla si alguna vez su hijo ha tenido un resultado positivo en el test de la TB:

SI



(compruébelo con el médico de su hijo si no lo sabe)



Marque esta casilla si alguna vez su hijo ha tomado pastillas para tratar o prevenir la TB:

SI



(compruébelo con el médico de su hijo si no lo sabe)

