


9. Inyectar la dosis

Utilice alcohol, o agua y jabón, para limpiar la piel de la zona donde va a poner la inyección a su hijo. La piel debe secarse antes de poner la inyección.

Pellizque ligeramente la piel. Inserte la aguja de la forma que el médico de su hijo le ha mostrado. Suelte la piel.

Empuje lentamente el émbolo de la jeringa hasta llegar al tope, asegurándose de que ha inyectado todo el líquido.



10. Tirar con decisión de la aguja y presionar suavemente (sin frotar) con una gasa o algodón

Tire con decisión de la aguja y presione suavemente en el punto donde ha puesto la inyección a su hijo con una gasa o un poco de algodón durante unos segundos.

¡No frote la zona!

No vuelva a colocar el protector de la aguja en la jeringa.

La aguja y la jeringa usadas deben depositarse en un contenedor de objetos punzantes que deberá sellarse y desecharse de forma apropiada.

Notificación de sospechas de reacciones adversas

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaRAM.es>

Lea este folleto junto con el prospecto del medicamento. Puede encontrar el prospecto en el Centro de información online de medicamentos de la AEMPS – CIMA a través del siguiente enlace: <https://cima.aemps.es>

Para obtener más información, consulte a su médico o enfermero.



✿ Debe administrarse **dos veces al día**.



✿ Debe administrarse **justo antes o justo después de una comida**.



✿ Si una dosis de Increlex no puede administrarse justo antes o después de una comida, esa dosis no deberá ponerse.



✿ Utilice un **lugar de inyección diferente** con cada dosis.



✿ Si deja de administrarse una **dosis**, en ningún caso deberán de aumentarse las dosis siguientes para compensar una o más dosis olvidadas. La siguiente dosis deberá administrarse a la **hora** habitual.

2°C - 8°C



✿ Debe mantenerse en nevera pero **NO congelarse**.

 **increlex**[®]
mecasermina

Instrucciones de uso

Este folleto es una guía rápida de referencia para preparar e inyectar Increlex[®]

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) Enero 2022

Disponible en la página web de la AEMPS www.aemps.gob.es

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante comunicar los efectos adversos que pudiera usted tener. Puede consultar la forma de hacerlo en el prospecto del medicamento.

Increlex – Instrucciones de uso

Increlex debe administrarse utilizando jeringas de pequeño tamaño y agujas estériles desechables.

Preparación de la dosis:

1. Lavarse las manos

Lávese las manos antes de empezar a preparar la inyección de Increlex.


2. Utilizar una aguja y una jeringa nuevas en cada inyección

Utilice una aguja y jeringa nuevas **cada vez** que se administre una dosis.



3. Preparar la inyección

Compruebe que el líquido es transparente e incoloro; **no** lo utilice si está turbio o se observan partículas en él, ni después de la fecha de caducidad. Si utiliza un vial nuevo, retire la tapa protectora pero no el tapón de caucho. Limpie este tapón de caucho con un algodón empapado en alcohol para evitar contaminaciones.



4. Inyectar aire en el vial

Antes de introducir la aguja en el vial, tire del émbolo hacia atrás para que entre en la jeringa una cantidad de aire igual a la dosis de Increlex a administrar. Introduzca la aguja a través del tapón de caucho del vial y a continuación empuje el émbolo para inyectar el aire en el vial según se indica.



5. Cargar la dosis

Deje la jeringa en el vial y de la vuelta a ambos. Sostenga la jeringa y el vial con firmeza. Asegúrese de que la punta de la aguja está dentro del líquido y a continuación tire del émbolo para que entre la dosis correcta en la jeringa.



6. Eliminar las burbujas de aire y rellenar la jeringa

Antes de sacar la aguja del vial, compruebe que no haya burbujas de aire en la jeringa. Si las hay, sostenga el vial y la jeringa con la aguja hacia arriba y golpee el lateral de la jeringa hasta que las burbujas asciendan. Saque las burbujas con ayuda del émbolo y luego vuelva a extraer líquido hasta completar la dosis correcta.



7. Listo para inyectar

Saque la aguja del vial.

No deje que la aguja entre en contacto con ningún objeto.

Ahora ya puede poner la inyección.

Inyección de la dosis:

Inyecte Increlex según las indicaciones que el médico de su hijo le haya dado.

No le ponga la inyección de Increlex si su hijo no puede comer en un plazo de 20 minutos antes o inmediatamente después de la inyección.

8. Decidir el lugar de la inyección

Decida el lugar donde pondrá la inyección: brazo, muslo, nalga o abdomen.

El lugar de inyección debe cambiarse con cada nueva dosis.

