

Deberá ponerse inmediatamente en contacto con su médico si cree que está experimentando una reacción de hipersensibilidad a este medicamento. Escriba a continuación el nombre y teléfono de su médico:

Doctor:

Tel:

Si su médico no puede atenderle, deberá solicitar urgentemente asistencia médica alternativa (por ejemplo, en el servicio de urgencias del hospital más cercano).

Para una información más detallada consulte el prospecto del medicamento. Puede encontrar el prospecto completo del medicamento en el Centro de información online de medicamentos de la AEMPS (CIMA):

<https://cima.aemps.es>

IMPORTANTE - TARJETA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

**Medicamentos que contienen abacavir
(solo o en combinación con otros principios activos)**

Lleve siempre esta tarjeta consigo

Los pacientes en tratamiento con abacavir, solo o en combinación con otros principios activos (como por ejemplo, dolutegravir, lamivudina, zidovudina, etc.) pueden desarrollar una reacción de hipersensibilidad (reacción alérgica grave) que **puede representar un riesgo para la vida** si este tratamiento continua.

PÓNGASE EN CONTACTO CON SU MÉDICO INMEDIATAMENTE para que le aconseje si debe interrumpir, o no, el tratamiento con este medicamento en caso de presentar:

- 1) una erupción cutánea, o**
- 2) uno o más de los síntomas incluidos en al menos DOS de los siguientes grupos:**

- fiebre,
- dificultad respiratoria, dolor de garganta o tos,
- náuseas o vómitos, diarrea o dolor abdominal,
- cansancio excesivo, dolores o malestar general.

Si ha interrumpido el tratamiento con abacavir (solo o en combinación con otros principios activos) debido a esta reacción **JAMAS VUELVA A TOMAR** este medicamento o cualquier otro medicamento que contenga abacavir, ya que **en cuestión de horas** puede presentar una bajada de la tensión arterial que puede representar un riesgo para su vida u ocasionarle la muerte.