

Se anima a las mujeres expuestas a Ponvory durante el embarazo a inscribirse en la monitorización mejorada de los resultados del embarazo (POEM, por sus siglas en inglés) de Ponvory que monitoriza los resultados de los embarazos. Si está interesada en participar, póngase en contacto con su médico.



Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaram.es>

▼ **PONVORY® (ponesimod)** **TARJETA DE INFORMACIÓN PARA LA PACIENTE ESPECÍFICA DE EMBARAZO** Información para mujeres en edad fértil

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Noviembre-2024

Disponible en la página web de la AEMPS <https://www.aemps.gob.es>

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante comunicar los efectos adversos que pudiera usted tener. Puede consultar la forma de hacerlo en el prospecto del medicamento.

Antes de empezar a tomar ponesimod



Ponesimod no puede utilizarse en mujeres embarazadas ni en mujeres en edad fértil (incluidas adolescentes) que no utilizan un método anticonceptivo efectivo ya que puede causar graves daños al feto si se toma durante el embarazo.

Si está embarazada, cree que podría estarlo, tiene intención de quedarse embarazada, o está en periodo de lactancia consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

Su médico le informará sobre los posibles daños graves que puede provocar al feto.

- Antes del inicio del tratamiento debe realizarse un test de embarazo para comprobar que no esté embarazada.
- Debe utilizar un método anticonceptivo efectivo mientras esté tomando ponesimod, y también durante 1 semana después de dejar de tomarlo.
- Hable con su médico sobre los métodos anticonceptivos fiables.

Mientras esté tomando ponesimod



- Mientras esté tomando ponesimod, no debe quedarse embarazada.
- Se debe repetir una prueba de embarazo a intervalos adecuados durante el tratamiento con ponesimod.
- Debe utilizar un método anticonceptivo eficaz durante todo el tratamiento y durante al menos 1 semana después de finalizarlo.
- El tratamiento con ponesimod se debe suspender al menos 1 semana antes de intentar concebir; póngase en contacto con su médico, farmacéutico o enfermera para obtener más información sobre el riesgo de efectos perjudiciales para el feto.
- Si se queda embarazada, sospecha que está embarazada o decide quedarse embarazada, debe informar a su médico cuanto antes. El tratamiento con ponesimod se debe interrumpir inmediatamente y debe programar una cita de seguimiento con su médico. Consulte a continuación cómo notificar un embarazo mientras toma ponesimod.
- No debe utilizar ponesimod durante la lactancia.

Después de tomar ponesimod



- Si deja de tomar ponesimod debido a un embarazo o por intentar quedarse embarazada, sus síntomas de esclerosis múltiple pueden reactivarse, empeorar o pueden aparecer nuevos síntomas. Informe a su médico inmediatamente si experimenta esto después de interrumpir el tratamiento con ponesimod.
- No debe intentar concebir durante al menos 1 semana después de interrumpir el tratamiento con ponesimod; se debe continuar usando métodos anticonceptivos eficaces al menos durante una semana.
- Debe informar inmediatamente a su médico de cualquier embarazo (deseado o no deseado) que tenga lugar durante el tratamiento con ponesimod y hasta una semana después de finalizar el tratamiento con ponesimod.