


|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>Si experimenta cualquiera de estos signos, informe al médico inmediatamente. Si tiene alguna duda sobre su tratamiento, consulte a su médico o farmacéutico.</b></p> | <p><b>Es importante que informe inmediatamente al médico prescriptor de cualquier embarazo o efecto adverso que pueda producirse durante el tratamiento con Opsumit.</b></p> <p>Centro de tratamiento:</p> <hr/> <p>Nombre del médico prescriptor:</p> <hr/> <p>Número de teléfono del médico prescriptor:</p> <hr/>  | <p style="text-align: right;"><b>Opsumit</b><br/>macitentan</p> <p><b>Tarjeta de información para el paciente</b></p> <p>Esta tarjeta contiene información de seguridad importante que necesita conocer si recibe tratamiento con Opsumit.</p> <hr/> <p>Lleve siempre consigo esta tarjeta y muéstresela al médico que le atienda.</p> |
|--|---|--|

7121385

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p><b>Embarazo</b><br/>Opsumit puede afectar de forma negativa al desarrollo del feto. Por tanto, no debe tomar Opsumit si está embarazada y tampoco debe quedarse embarazada mientras tome Opsumit. Además, si padece hipertensión arterial pulmonar, el embarazo puede deteriorar en gran medida los síntomas de su enfermedad.</p> <p><b>Anticoncepción</b><br/>Deberá utilizar un método anticonceptivo fiable para el control de la natalidad (anticoncepción) durante el tratamiento con Opsumit. Consulte con su médico ante cualquier duda que pueda tener.</p> | <p>Debe realizar pruebas de embarazo antes de iniciar el tratamiento con Opsumit y mensualmente durante el tratamiento, incluso si piensa que no está embarazada.</p> <p>Del mismo modo que otros medicamentos de esta clase, Opsumit puede afectar al hígado. El médico le realizará análisis de sangre antes de que comience el tratamiento con Opsumit y durante el tratamiento para determinar si el hígado funciona correctamente.</p> | <p>Los signos indicativos de que el hígado puede no estar funcionando correctamente son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• náuseas (necesidad de vomitar)</li> <li>• vómitos</li> <li>• fiebre (temperatura elevada)</li> <li>• dolor de estómago (abdomen)</li> <li>• ictericia (coloración amarillenta de la piel o el blanco de los ojos)</li> <li>• orina de color oscuro</li> <li>• picor en la piel</li> <li>• letargo o fatiga (cansancio o agotamiento inusuales)</li> <li>• síndrome pseudogripal (dolor articular y muscular con fiebre)</li> </ul> |
|---|---|--|