

# TARJETA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

## ▼ CIBINQO® (abrocitinib)

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Marzo-2023

Disponible en la página web de la AEMPS [www.aemps.gob.es](http://www.aemps.gob.es)

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante comunicar los efectos adversos que pudiera usted tener. Puede consultar la forma de hacerlo en el prospecto del medicamento.

## Fecha de inicio de tratamiento y datos de contacto

Nombre del paciente: \_\_\_\_\_

Nombre del médico: \_\_\_\_\_  
[prescriptor de Cibinco (abrocitinib)]

Teléfono del médico: \_\_\_\_\_

Fecha de inicio del tratamiento: \_\_\_\_\_

## Recuerde:

- Lleve esta tarjeta consigo en todo momento y muéstrasela a cualquier profesional sanitario que le atienda, (p.ej. cuando acuda a urgencias o a la farmacia).
- Esta tarjeta contiene información de seguridad importante que debe conocer antes y durante el tratamiento con Cibinqo. Lea el prospecto del medicamento para obtener más información. Puede consultar el prospecto actualizado en el Centro de información online de medicamentos de la AEMPS (CIMA): <http://cima.aemps.es>
- Si tiene alguna duda sobre esta información, consulte a su médico o farmacéutico.

## Qué es Cibinqo y para qué se utiliza:

- Cibinqo contiene el principio activo abrocitinib. Pertenece a un grupo de medicamentos denominados inhibidores de las Janus quinasas, que ayudan a reducir la inflamación. Actúa reduciendo la actividad de una enzima del organismo denominada "Janus quinasa", que está implicada en la inflamación.
- Cibinqo se utiliza para tratar a adultos con dermatitis atópica de moderada a grave, también conocida como eccema atópico. Al reducir la actividad de las enzimas quinasas Janus, Cibinqo disminuye el picor y la inflamación de la piel. Esto, a su vez, puede reducir las alteraciones del sueño y otras consecuencias del eccema atópico como, por ejemplo, la ansiedad o la depresión y mejora la calidad de vida en general.

## **Aspectos a tener en cuenta durante el tratamiento con Cibinco (abrocitinib):**

Cibinco (abrocitinib) como todos los medicamentos, puede provocar efectos adversos aunque esto no significa que todas las personas los sufran. Informe a su médico inmediatamente si experimenta alguno de los síntomas o signos que se describen a continuación.

### **Riesgo de infecciones graves:**

Consulte a su médico o farmacéutico antes y durante el tratamiento con Cibinco si tiene síntomas como fiebre, heridas, sensación de más cansancio de lo habitual o problemas dentales, ya que pueden ser signos de infección.

## **Vacunación:**

No se recomienda la vacunación con ciertas vacunas (vacunas elaboradas con microorganismos vivos atenuados, como por ejemplo, la vacuna de BCG para prevenir la tuberculosis) inmediatamente antes y mientras dure el tratamiento con Cibinqo. Informe a su médico o farmacéutico si se ha vacunado recientemente o si tiene previsto vacunarse.

## **Riesgo de coágulos de sangre en las venas o en los pulmones:**

Consulte a su médico o farmacéutico si repentinamente le falta el aliento o tiene dificultad para respirar, dolor en el pecho o dolor en la parte superior de la espalda, hinchazón en las piernas o en los brazos, dolor o dolor a la palpación en las piernas, o enrojecimiento o cambio de color en las piernas o los brazos, ya que estos pueden

ser signos de coágulos de sangre en las venas.

### **Riesgo de enfermedad cardíaca:**

Consulte a su médico o farmacéutico antes y durante el tratamiento si desarrolla dolor intenso en el pecho u opresión (que puede extenderse a los brazos, la mandíbula, el cuello y la espalda), dificultad para respirar, sudor frío, aturdimiento o mareos repentinos, ya que pueden ser signos de un infarto.

### **Riesgo de cáncer:**

Se ha observado un tipo de cáncer denominado cáncer de piel no melanoma en pacientes que toman Cibirino. Su médico puede recomendarle que se realice exámenes de la piel periódicamente mientras toma Cibirino. Si aparecen nuevas lesiones en la piel

durante o después del tratamiento o si las lesiones existentes cambian de aspecto, informe a su médico.

### **Pruebas analíticas:**

Su médico le realizará análisis de sangre (incluyendo análisis de colesterol) antes y durante el tratamiento con Cibinqo. En función de los resultados, su médico podrá ajustar el tratamiento.

### **Anticoncepción y embarazo:**

Cibinqo **NO se debe tomar** durante el embarazo.

Si usted es una mujer en edad fértil, utilice un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con Cibinqo y al menos durante un mes después de la última dosis. Su médico puede asesorarle sobre los métodos anticonceptivos adecuados.

Si se queda embarazada o cree que puede estar embarazada durante el tratamiento, informe a su médico inmediatamente.

### **Notificación de sospechas de reacciones adversas**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:  
<https://www.notificaRAM.es>