

Riesgo de Cáncer

Este fármaco puede aumentar su riesgo de desarrollar cáncer, particularmente cáncer de piel. Si aparecen nuevas lesiones en la piel durante o después del tratamiento o si las lesiones existentes cambian de apariencia, informe a su médico.

Riesgo de perforación en su intestino

Este fármaco puede incrementar el riesgo de perforación del intestino especialmente si tiene enfermedad de Crohn. Informe inmediatamente a su médico si presenta:

- Aparición de dolor de estómago o abdominal repentino o inexplicable.
- Náuseas, vómitos y/o hinchazón del abdomen
- Fiebre

Muestre esta tarjeta a todos los profesionales sanitarios que le presten atención médica- por ejemplo, su dentista o un médico de urgencias.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:
<https://www.notificaRAM.es>

Su Nombre:

Nombre y teléfono del médico prescriptor

Fecha de inicio de la medicación:

Tarjeta de información para el paciente Rinvoq (upadacitinib)

- Esta tarjeta contiene información de seguridad importante que debe saber antes y durante el tratamiento con Rinvoq®.
- Para más información, consulte el prospecto.

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Julio 2023

Disponible en la página web de la AEMPS www.aemps.gob.es

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante comunicar los efectos adversos que pudiera usted tener. Puede consultar la forma de hacerlo en el prospecto del medicamento.

Riesgo de infecciones

Este fármaco puede empeorar una infección preexistente o aumentar el riesgo de presentar una nueva infección como son: tuberculosis (TB), herpes o hepatitis viral.

Acuda inmediatamente a su médico si presenta síntomas de infección como:

- Fiebre, sudoración, escalofríos, pérdida de peso, tos persistente. Pueden ser signos de tuberculosis.
- Lesiones en la piel dolorosas con ampollas. Pueden ser signos de herpes.
- Cansancio o sensación falta de aire. Pueden ser signos de neumonía.

Administración de Vacunas

No se deben administrar vacunas vivas durante o justo antes de empezar el tratamiento

Antes de recibir cualquier vacuna, informe al profesional sanitario.

Riesgo de Enfermedad Cardíaca

El tratamiento con este fármaco se ha asociado con aumentos en el colesterol.

Su médico hará controles de sus niveles de colesterol periódicamente.

Informe a su médico inmediatamente si experimenta alguno de los siguientes signos/síntomas:

- Dolor intenso u opresión en el pecho (que puede extenderse a los brazos, mandíbula, cuello, espalda).
- Dificultad para respirar.
- Sudor frío.
- Debilidad en un brazo y/o pierna.

Embarazo, lactancia y medidas anticonceptivas

Rinvoq® no se debe tomar durante el embarazo. Si está en edad fértil, use métodos anticonceptivos eficaces mientras esté en tratamiento con este medicamento y durante al menos 4 semanas después de la última dosis.

Acuda a su médico inmediatamente si desea quedarse embarazada o si se ha quedado embarazada durante el tratamiento. No debe tomar esta medicación durante el periodo de lactancia.

Riesgo de Formación de coágulos sanguíneos

Este medicamento puede causar coágulos de sangre en sus piernas que pueden desplazarse a sus pulmones. Informe a su médico inmediatamente si experimenta alguno de los siguientes síntomas:

- Hinchazón o dolor en una pierna o brazo
- Calor o enrojecimiento en una pierna o brazo
- Dificultad para respirar repentina
- Respiración rápida
- Dolor en el pecho