▼EPYSQLI™ (ECULIZUMAB)

TARJETA DE INFORMACIÓN PARA PACIENTES

Información de seguridad importante para pacientes en tratamiento con ▼Epysqli™

Muestre esta tarjeta a cualquier médico que le trate.

▼Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Febrero 2026
Disponible en la web de la AEMPS: www.aemps.gob.es

Eculizumab puede reducir la capacidad de su sistema inmunitario para combatir infecciones, **especialmente infecciones meningocócicas, que requieren atención médica inmediata.**

Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, **debe llamar inmediatamente a su médico o buscar atención médica de emergencia, preferiblemente en urgencias de un centro de atención médica importante.**

- Dolor de cabeza con náuseas o vómitos
- Dolor de cabeza con rigidez de nuca o de espalda
- Fiebre
- Erupción
- Confusión
- Dolor muscular intenso junto con síntomas tipo gripal
- Sensibilidad a la luz

Busque atención médica de urgencia si tiene alguno de estos signos o síntomas y muestre esta tarjeta.

Lleve esta tarjeta consigo en todo momento durante el tratamiento y hasta 3 meses después de su última dosis de eculizumab. El riesgo de infección meningocócica puede continuar durante un largo periodo de tiempo después de la última dosis de eculizumab.

Version: 2.0 (Febrero 2026)

INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES SANITARIOS

- A este paciente se le ha prescrito eculizumab, que incrementa la suceptibilidad del paciente a una infección meningocócica (*Neisseria meningitidis*) u otras infecciones generalizadas
- Todos los pacientes deben vacunarse, al menos, 2 semanas antes de recibir eculizumab. Los pacientes que inicien eculizumab menos de 2 semanas después de recibir la vacuna meningocócica deben recibir antibióticos profilácticos adecuados hasta 2 semanas después de la vacunación.
- Los paciente deben recibir vacunación o revacunación de acuerdo con las pautas nacionales actuales de vacunación para su uso.
- Las infecciones meningocócicas pueden tener un desenlace fatal si no se diagnostican y se tratan de forma temprana.
- Evaluar de inmediato si se sospecha que hay infección y tratar con los antibióticos adecuados si es necesario.
- Póngase en contacto con su médico prescriptor lo antes posible (ver datos a continuación).

Para obtener más información sobre eculizumab, consulte el prospecto completo en el Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS (CIMA), disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/1231735001/P_1231735001.html; o puede solicitarlo a través del correo electrónico: bioepis.mi@medinformation.co.uk.
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaRAM.es.

Nombredelpaciente:_____

Hospital:_____

Datos de contacto profesional sanitario: _____

Número de teléfono:_____

Fecha(s) de vacunación: _____

Vacuna (incluyendo marca comercial y lote en mayúsculas)	Serogrupo (s)	Número de dosis	Fecha administración pauta inicial	Fechas administración dosis de recuerdo	Profilaxis antibiótica, en caso preciso
			__/__/__	__/__/__	☐ ☐ No aplica Sí, fecha inicio:__/__/__
			__/__/__	__/__/__	☐ ☐ No aplica Sí, fecha inicio:__/__/__
			__/__/__	__/__/__	☐ ☐ No aplica Sí, fecha inicio:__/__/__