

NIÑOS PEQUEÑOS

Signos y síntomas de meningitis y/o sepsis, que son infecciones potencialmente mortales.

En los bebés estos signos y síntomas pueden ser diferentes de los que se suelen ver en niños pequeños. Estos dibujos pueden ayudarle a identificar los signos y síntomas que pueden detectarse en los niños.

➔ Es muy importante buscar asistencia médica **INMEDIATAMENTE** si usted detecta **ALGUNO** de los siguientes signos o síntomas.



Fiebre



Manos y/o pies fríos



Vómitos o rechazo de alimentos



Somnolencia, dificultad para despertarse



Confusión e irritabilidad



Dolor de cabeza intenso



Dificultad para respirar



Rechazo a las luces brillantes



Piel pálida, con manchas; marcas/sarpullido



Temblor incontrolable



Rigidez de cuello



Dolor en las piernas

TARJETA DE INFORMACIÓN DEL PACIENTE PEDIÁTRICO CON HPN/SHUa/MGg SOLIRIS (ECULIZUMAB)

Nombre del paciente

Información de contacto de los padres/tutores

Nombre del médico

Información de contacto del médico

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Septiembre 2023

Si no puede ponerse en contacto con el médico, lleve al niño/a a un servicio de urgencias inmediatamente y muestre esta tarjeta al personal.

TARJETA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE PEDIÁTRICO CON HPN/SHUa/MGg

→ [Información importante para los cuidadores](#)

Este paciente pediátrico está recibiendo tratamiento con Soliris® (eculizumab) y es posible que sea más propenso a sufrir infecciones, especialmente a las producidas por meningococo, incluidas la meningitis y la sepsis (en esta, la infección ha llegado a la sangre). Estas infecciones pueden ser muy graves.

Si observa que el/la niño/a presenta alguno de los signos y síntomas indicados en esta tarjeta, que podrían indicar una infección grave, acuda a su médico inmediatamente.

→ [Información de seguridad importante para los profesionales sanitarios](#)

Este paciente está recibiendo tratamiento con Soliris® (eculizumab), que es un anticuerpo que inhibe la activación del complemento terminal. Eculizumab aumenta la sensibilidad del paciente a la infección por meningococo (*Neisseria meningitidis*) y otras infecciones. Antes de comenzar el tratamiento, el paciente debe haber recibido una vacuna contra dicho patógeno, aunque puede seguir siendo susceptible a las infecciones por meningococo u otras infecciones generales.

- › Las infecciones meningocócicas pueden tener un desenlace fatal si no se tratan a tiempo.
- › Trate con antibióticos adecuados si sospecha infección.
- › Contacte con el médico prescriptor lo antes posible.

Para más información consulte el prospecto disponible en <https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=07393001>

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del sistema español de farmacovigilancia de medicamentos de uso humano: <https://www.notificaRAM.es>.

BEBÉS

Signos y síntomas de meningitis y/o sepsis, que son infecciones potencialmente mortales.

En los bebés estos signos y síntomas pueden ser diferentes de los que se suelen ver en niños pequeños. Estos dibujos pueden ayudarle a identificar los signos y síntomas que pueden detectarse en los bebés.

➔ Es muy importante buscar asistencia médica **INMEDIATAMENTE** si usted detecta **ALGUNO** de los siguientes signos o síntomas.



Fiebre



Manos y/o pies fríos



Vómitos o rechazo de alimentos



Rechazo al contacto físico



Somnolencia, flacidez, ausencia de respuesta



Respiración rápida



Palidez, piel enrojecida, manchas/sarpullido



Gemidos o llantos inusuales



Tensión o abultamiento de la zona de la cabeza que normalmente es blanda