

Duodopa®

Solución para perfusión

(foslevodopa/foscarbidopa)

Para enfermedad de Parkinson avanzada

Esta guía contiene información de seguridad importante que debe tener en cuenta

Tenga esta guía a mano cuando se esté preparando para usar este medicamento

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
Noviembre 2023

Disponible en la página web de la AEMPS www.aemps.gob.es

abbvie

¿Por qué debo leer esta guía del paciente?

Duodopa solución para perfusión® es un medicamento para tratar los síntomas de la enfermedad de Parkinson avanzada.

Se utiliza cuando otros medicamentos ya no funcionan tan bien como lo hacían para tratar los síntomas de la enfermedad.

Este medicamento será administrado por debajo de la piel a través de un pequeño tubo de plástico (cánula) en el área alrededor del ombligo. Esta área es su sitio de perfusión.

Se administra a través de este tubo continuamente las 24 horas del día.

Algunas personas que usan este medicamento pueden presentar efectos adversos alrededor de la piel donde se introduce la cánula en el cuerpo.

Éstos pueden ser:

- **Reacción de la piel.** Esto es cuando la piel se irrita/inflama.
- **Infección de la piel.** Esto es cuando entran gérmenes en la piel.

Una infección de la piel puede volverse grave cuando los gérmenes entran en la sangre y se propagan por todo el cuerpo. Esto se llama sepsis.

Esta guía para el paciente ayudará a usted y a su cuidador a aprender sobre:



Cómo elegir el sitio de perfusión.



Cómo reconocer una reacción o infección en el lugar de la perfusión.



Qué puede hacer para ayudar a reducir la posibilidad de una reacción o infección en el lugar de la perfusión.



Qué puede hacer si tiene una reacción o infección en el lugar de la perfusión.



Dónde puede encontrar más información sobre su medicamento.



Cómo elegir su sitio de perfusión

Como se ha dicho previamente, Duodopa se administra por debajo de la piel durante 24 horas mediante una cánula o tubo. El equipo de perfusión (cánula) puede permanecer colocada hasta 3 días mientras se esté perfundiendo la medicación de manera continua.

Puede usar su estómago (abdomen) como sitio de perfusión a menos que su médico le indique que use otro sitio. Asegúrese de que el lugar que elije esté al menos a 5 cm (aproximadamente la longitud de su dedo meñique) de su ombligo.

- Evite la línea del cinturón porque esta área puede irritarse por la presión del cinturón contra la piel.
- Evite cualquier piel con cicatrices, dura o con estrías.
- Evite los pliegues de la piel o zonas donde la piel se dobla mucho de forma natural.

Cada 3 días cambie el sitio de perfusión: No obstante, si antes de los 3 días aparecen alteraciones en su piel, como enrojecimiento, hinchazón y dolor, cambie el lugar de perfusión.

Su nuevo sitio de perfusión debe estar al menos a 2,5 cm (aproximadamente el espacio de dos dedos) del último que usó.


Cambie el sitio de perfusión cada 3 días o antes dependiendo de los cambios en su piel (como enrojecimiento, hinchazón y dolor).

Al cambiar el sitio de perfusión utilice un nuevo equipo de perfusión.

Utilice un equipo de perfusión nuevo (cánula/tubo) cada vez que cambie su sitio de perfusión.

Una vez que haya usado un sitio de perfusión, no lo vuelva a usar durante 12 días. Esto ayudará a que su piel sane por completo.

Hay diferentes maneras de ayudarle a recordar que no reutilice un sitio de perfusión que haya usado hace poco. Una forma es fingir que tu estómago es un reloj. Puede colocar la cánula en un intervalo diferente de dos “horas” cada vez. Puede comenzar con el sitio a las 12 en punto, luego a las 2 en punto seguido de las 4 en punto y así sucesivamente.



Anote la fecha y el lugar de sus sitios de perfusión para ayudarlo a realizar un seguimiento.




Cómo reconocer una reacción o infección en el lugar de la perfusión

Busque cambios donde la cánula entra en su piel.

Los cambios en la piel pueden ocurrir con o sin fiebre e incluyen:

- Enrojecimiento
- Calor en la zona
- Hinchazón
- Sensibilidad/dolor
- Cambios en el color de la piel cuando se presiona





Qué puede hacer para ayudar a reducir la posibilidad de infección o de reacción en el punto de perfusión.

A continuación, se presentan aspectos a tener en cuenta en el manejo de la perfusión.



Use un área bien iluminada que esté limpia (como una mesa) para preparar su perfusión.



Mantenga el sitio de perfusión y el equipo de perfusión limpios y esterilizados cuando prepare la perfusión.



Lávese siempre las manos con agua y jabón y séquelas con una toalla de papel. No toque nada sucio después.



Evite que la punta de la jeringa, adaptador del vial, sondas, o el conector toque una superficie sucia.



Deseche con cuidado cualquier material usado que pueda estar contaminado.



Cuando haya elegido el lugar de la perfusión, límpiase la piel con una toallita o gasa con alcohol. Asegúrese de limpiar en una dirección para no contaminar el área limpiada. Permita que el área se seque durante al menos 1 minuto.

Cambie el sitio de perfusión cada 3 días o antes dependiendo de los cambios en su piel (como enrojecimiento, hinchazón y dolor).



Cuando use un nuevo sitio de perfusión, no lo repita en los siguientes 12 días. Esto ayudará a que su piel sane por completo.



Mantenga siempre una distancia de 2,5 cm (aproximadamente el espacio de dos dedos) del último sitio de perfusión que utilizó.



Utilice siempre una cánula y tubos nuevos cuando cambie a un nuevo sitio de perfusión.



Recorte cualquier vello alrededor del sitio de perfusión con unas tijeras. Esto ayudará a que el adhesivo de la cánula se pegue a su piel. Si debe afeitarse la piel, espere un día antes de usar el sitio de perfusión.



Use ropa cómoda que no irrite la piel en el lugar de la perfusión.



Qué debe hacer si tiene una reacción o infección en el lugar de la perfusión

Cambie su sitio de perfusión, no espere 3 días. Llame a su médico, enfermera o farmacéutico si tiene los siguientes síntomas:

- Enrojecimiento
- Calor en la zona
- Hinchazón
- Sensibilidad/dolor
- Cambios en el color de la piel cuando se presiona

No reutilice un sitio infectado durante al menos 12 días o hasta que se haya curado.



Dónde puede encontrar más información

Para obtener más información sobre su medicamento, consulte el prospecto de su medicamento (foslevodopa/foscarbidopa) que se encuentra en el interior de la caja o en el Centro de Información online de medicamentos de la AEMPS (CIMA) <https://cima.aemps.es> y las instrucciones de uso de la bomba que vinieron con su medicamento.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaRAM.es>