
Nombre paciente

Nombre del médico prescriptor de epcoritamab

Teléfono del médico prescriptor de epcoritamab

Teléfono del médico de urgencias

Fecha de la primera dosis de epcoritamab

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:
<https://www.notificaRAM.es>

abbvie

Tarjeta de información para pacientes en tratamiento con ▼Tepkinly®

Por favor lleve consigo esta tarjeta todo el tiempo. Muéstrela a cualquier profesional sanitario que le atienda cuando acuda a un hospital.

Informe a cualquier profesional sanitario que lo atienda que está tratado con Tepkinly® (epcoritamab) en especial si acude porque presenta algún efecto adverso tras el tratamiento con epcoritamab.

Información sobre prevención de riesgos acordada
con la Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios (AEMPS)
Noviembre 2023

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

Información para pacientes

Tepkinly® (epcoritamab) puede causar efectos adversos que pueden ser graves.

Contacte con su médico o acuda inmediatamente a urgencias si presenta alguno de los siguientes síntomas:

- Fiebre (38° o superior)
- Mareo o aturdimiento
- Escalofríos
- Latido cardíaco acelerado
- Dificultad/problemas al respirar
- Dolor de cabeza
- Dificultad al hablar/escribir
- Somnolencia
- Confusión/desorientación
- Debilidad muscular
- Convulsiones
- Pérdida de memoria

Información para el profesional sanitario

- Este paciente está siendo tratado con epcoritamab, un anticuerpo biespecífico que ataca a las células T.
- Con el tratamiento de epcoritamab, puede ocurrir el síndrome de liberación de citoquinas (SLC) y el síndrome de neurotoxicidad asociado a células inmunoefectoras (ICANS, de sus siglas en inglés), que pueden ser graves si no se tratan inmediatamente.
El SLC puede ocurrir varias horas o días después de la administración de epcoritamab, generalmente después de la primera dosis completa en el ciclo 1. El ICANS puede ocurrir varios días o semanas después de la administración con epcoritamab.
- **Comuníquese con el médico que trata al paciente de inmediato para obtener más información (detalles de contacto al dorso).**