▼ Xenpozyme (olipudasa alfa)

TARJETA DEL PACIENTE

▼ *Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante comunicar los efectos adversos que pudiera usted tener. Puede consultar la forma de hacerlo en el prospecto del medicamento.*

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)- enero 2026

Disponible en la página web de la AEMPS www.aemps.gob.es

¿Qué es Xenpozyme?

Xenpozyme es un medicamento que contiene una enzima artificial, olipudasa alfa, como principio activo.

Este tratamiento se usa en pacientes con déficit (parcial o completo) de una enzima denominada "esfingomielinasa ácida", como sustituto de la misma. Esta deficiencia es la que puede provocar una variedad de síntomas en estos pacientes.

Nombre del paciente:

Médico responsable del tratamiento:

- Nombre y Apellidos:
- Contacto (teléfono):
- Hospital/centro:
- Contacto de emergencia (teléfono):

Esta tarjeta del paciente contiene información importante que debe conocer al recibir tratamiento con Xenpozyme. Para obtener más información, lea el prospecto de este medicamento.

Muestre esta tarjeta a cualquier profesional sanitario que intervenga en su atención médica.

Para obtener más información, escanee el código QR.

▼ Xenpozyme (olipudasa alfa)

Efectos adversos importantes

Xenpozyme se administra en forma de perfusión intravenosa. Algunos pacientes, durante o después de la perfusión, han experimentado una reacción alérgica grave, que debe tratarse de inmediato.

Busque atención médica urgente si aparecen o empeoran alguno de los siguientes signos y/o síntomas durante o después de la perfusión:

- Dificultad para respirar, asfixia
- Mareo, debilidad o desmayo
- Pulso débil y rápido
- Náuseas, vómitos o diarrea
- Piel enrojecida y pálida, ronchas, picor

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaRAM.es.

Información para mujeres en edad fértil (incluidas adolescentes)

Se recomienda realizar una prueba de embarazo antes del inicio del tratamiento.

Se aconseja a las mujeres en edad fértil que utilicen métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento y durante los 14 días siguientes a la última dosis si se interrumpe la administración de Xenpoxyme.

Comente la necesidad de tomar medidas anticonceptivas eficaces apropiadas con su médico responsable de la prescripción de este tratamiento.

Póngase en contacto con su médico responsable del tratamiento si sospecha que podría estar embarazada, tiene intención de quedarse embarazada o si está en periodo de lactancia.