

Tarjeta de información para el paciente

Lleve consigo esta tarjeta en todo momento y muéstrela a cualquier profesional sanitario que le atienda.

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Julio-2024

Disponible en la página web de la AEMPS (www.aemps.gob.es)

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante comunicar los efectos adversos que pudiera usted tener. Puede consultar la forma de hacerlo en el prospecto del medicamento

Zilucoplán puede disminuir la capacidad de su sistema inmunitario para combatir las infecciones, especialmente infecciones meningocócicas, las cuales requieren atención médica inmediata.

Llame a su médico o solicite atención médica de urgencia de inmediato si presenta cualquiera de estos signos o síntomas sugestivos de infección meningocócica:

- Dolor de cabeza con cualquiera de estos otros síntomas:
 - Vómitos o náuseas
 - Cuello o espalda rígida
- Fiebre
- Erupción cutánea (pequeñas manchas rojas en la piel)
- Sensibilidad de los ojos a la luz
- Confusión
- Disminución del nivel de conciencia y convulsiones
- Decaimiento
- Dolores musculares acompañados de síntomas parecidos a los de una gripe
- Manos y pies fríos junto con temblores

Lleve esta tarjeta con usted en todo momento durante el tratamiento y durante 2 meses después de su última dosis de zilucoplán.

El riesgo de contraer una infección meningocócica puede continuar durante varias semanas después de su última dosis de zilucoplán.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaRAM.es>.

Información importante sobre seguridad para profesionales sanitarios

Este paciente está tomando zilucoplán, un inhibidor del componente 5 (C5) del complemento que puede aumentar la susceptibilidad del paciente a las infecciones meningocócicas causadas por *Neisseria meningitidis*.

En caso de sospecha de infección meningocócica, deberán tomarse medidas adecuadas como el tratamiento con antibióticos y la interrupción del tratamiento con zilucoplán hasta que se pueda descartar la infección meningocócica.

Póngase en contacto con el médico prescriptor del zilucoplán indicado lo antes posible si el paciente presenta signos o síntomas de infección meningocócica.

Nombre del paciente _____

Nombre del prescriptor _____

Identificación única del paciente de PAC UCB-ZIL-ES-

Número de teléfono del prescriptor _____

Número de teléfono en caso de urgencia _____

Número de referencia _____