



# INSTRUCCIONES DE USO DE

## PECFENT® (FENTANILO PARA PULVERIZACIÓN NASAL)

Lea este material conjuntamente con el prospecto del medicamento disponible en el interior del envase o en el centro de información online de la AEMPS (<https://cima.aemps.es>)



### Instrucciones para abrir y cerrar el envase a prueba de niños

- 1.- Introduzca los dedos en las cavidades traseras y apriete empujando el botón hacia abajo (**Fig. 1**).
- 2.- Para cerrar, presione los dos lados del estuche, una contra otra hasta que escuche el clic (**Fig. 2**).



### PREPARACIÓN DEL FRASCO DE PECFENT® PARA SU USO

Cada frasco nuevo de PecFent® pulverización nasal debe ser activado o preparado para su uso inicial de la siguiente manera:



1. Antes de ser usado, el frasco de PecFent® muestra dos líneas rojas en la ventana de recuento.
2. Retire la tapa protectora de plástico transparente de la boquilla. Sujete recto el pulverizador con el pulgar en la parte inferior del frasco y con los dedos índice y medio sobre las lengüetas a cada lado de la boquilla. Apriete con firmeza hacia abajo sobre las lengüetas hasta oír un "clic" y luego suelte las lengüetas (**Fig. 3**). Oirá un segundo "clic" y la ventana de recuento cambiará a una única barra roja.
3. Deberá presionar el frasco 3 veces más (**Fig. 4**). La ventana de recuento cambiará con cada presión.

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Noviembre-2024

4. Cuando vea una barra verde en la ventana de recuento, el pulverizador nasal PecFent® estará listo para usarse (**Fig. 5**).

Si no va a utilizar el medicamento inmediatamente, ponga la tapa protectora. A continuación, introduzca el frasco en el envase a prueba de niños. Si el frasco no se ha utilizado durante más de 5 días, se debe preparar nuevamente antes de volver a utilizarlo disparando una pulverización.


Durante la preparación, las pulverizaciones no deben dirigirse hacia usted mismo, otras personas, superficies u objetos que puedan entrar en contacto con otras personas, especialmente niños. El frasco pulverizador está equipado con un contador automático y siempre contiene 8 pulverizaciones. El conteo comienza después de que se haya activado el frasco durante el primer uso e indica cuántas pulverizaciones se han utilizado ya (**Fig. 6**). Una vez que el frasco se ha preparado, no debe utilizarse durante más de 60 días.



Fig. 6

## USO CORRECTO DE PECFENT®

1. Compruebe que hay una barra verde. Siéntese con la cabeza recta y retire el tapón protector.
2. Sujete el frasco con el pulgar en la parte inferior y los dedos índice y medio en las lengüetas. Introduzca la punta del pulverizador aproximadamente 1 cm en una fosa nasal (**Fig. 7**).



3. Para activar la pulverización, presione firmemente las lengüetas del frasco hacia abajo hasta que se oiga un clic y el número en la ventana numérica aumente en 1, suelte las lengüetas. Es posible que no note nada en la fosa nasal; no se base en ello para pensar que el pulverizador no funciona, básese en el clic y en el contador.
4. Según la dosis prescrita, puede ser necesario administrar una pulverización adicional en la otra fosa nasal (**Fig. 8**).
5. No se suene la nariz inmediatamente después de la aplicación para asegurarse de que todo el ingrediente activo permanezca en la nariz.
6. Después del uso, vuelva a colocar la tapa protectora y coloque el frasco pulverizador en el recipiente a prueba de niños. Manténgalo fuera del alcance y la vista de los niños.

## NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS

---

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaRAM.es>