

INSTRUCCIONES DE USO DE


COMPRESIDOS CON APLICADOR BUCAL DE FENTANILO

Lea este material conjuntamente con el prospecto del medicamento disponible en el interior del envase o en el centro de información online de la AEMPS (<https://cima.aemps.es>)


Cómo tomar este medicamento

- Puede beber un poco de agua antes de tomarlo, pero no debe beber ni comer nada durante su uso.
- Cada unidad está sellada en su propio blíster. No abra el envase hasta que esté listo para usarlo


1. Cuando esté listo, abra el envase con tijeras. Desprenda el respaldo del blíster y retire la unidad. El extremo que debe introducirse en la boca es el que lleva impreso la dosis (200, 400, 600, 1.200, 1.600)



Sujete la unidad por el mango.



2. Coloque el comprimido dentro de la boca, entre el interior de las mejillas y las encías. Con el aplicador, desplace continuamente el medicamento por la boca, especialmente por el interior de las mejillas.



Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Noviembre-2024

3. Gire el mango con frecuencia.
4. Termine la unidad completamente en unos **15 minutos**. Si la termina demasiado rápido, tragará más medicamento y tendrá menos alivio
5. No muerda ni mastique el comprimido, ya que esto se traducirá en menos alivio del dolor que cuando se toma según las indicaciones.
6. No trague el comprimido entero. Si usted traga un comprimido antes de que atraviese la mucosa de la boca, es posible que consiga menos alivio para su dolor irruptivo.
7. Si usted tiene la boca seca, puede tomar agua para humedecer la boca antes de tomar un comprimido.

Este medicamento contiene 2 gramos de azúcar.

Es importante mantener una higiene bucal regular para prevenir las caries dentales:

- Cepille sus dientes por lo menos dos veces al día y use hilo dental por lo menos una vez al día.
- Enjuáguese la boca con agua o lávese los dientes a los pocos minutos de la aplicación.
- Visite al dentista dos veces al año para una limpieza dental regular.

NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaRAM.es>