

INSTRUCCIONES DE USO DE

PELÍCULA BUCAL DE FENTANILO

Lea este material conjuntamente con el prospecto del medicamento disponible en el interior del envase o en el centro de información online de la AEMPS (<https://cima.aemps.es>)

Cómo usar este medicamento

Abra el sobre de fentanilo inmediatamente antes de usarlo, tal como establecen las instrucciones del sobre.

Use la lengua para humedecer el interior de su mejilla, o enjuáguese la boca con agua para humedecer la zona de colocación de fentanilo, escupiéndola antes de utilizar el medicamento.

Con las manos secas y limpias, coloque la película bucal de fentanilo entre su dedo índice y el pulgar, con la cara rosa dirigida hacia el pulgar.

Sitúe con cuidado la cara rosa de la película bucal de fentanilo en el interior de su boca, de manera que el lado rosa quede en contacto con el interior de su mejilla

Presione y manténgala en su sitio durante un mínimo de 5 segundos, hasta que se pegue firmemente.

No debe beber durante cinco minutos.

No coma hasta que la película no se haya disuelto por completo después de aproximadamente 30 minutos. Consulte el prospecto para obtener más información.



NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaRAM.es>

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Noviembre-2024

Disponible en la web de la AEMPS: www.aemps.gob.es