- tiene diarrea o vómitos, o no puede comer o beber líquidos en cantidades suficientes;
- siente cualquier otro cambio repentino en su bienestar;
- un médico que no sea el médico prescriptor de VANFLYTA le cambia la medicación.

Consulte primero con su médico antes de tomar VANFLYTA junto con otros medicamentos, incluso los obtenidos sin receta o los suplementos, ya que estos pueden aumentar el riesgo de que desarrolle una prolongación del intervalo QT.

Para más información, leer el prospecto antes de utilizar este medicamento.

Información importante para los profesionales sanitarios

VANFLYTA se asocia a prolongación del intervalo QT, lo que puede aumentar el riesgo de arritmias ventriculares o de *torsade de pointes.*

- Interrumpir VANFLYTA si el intervalo QTcF es ≥501 ms y suspender permanentemente si se asocia a *torsade de pointes,* taquicardia ventricular polimórfica o signos/síntomas de arritmia potencialmente mortal. VANFLYTA está contraindicado en pacientes con síndrome de QT largo congénito.
- Durante el tratamiento con VANFLYTA, comprobar los electrolitos séricos y corregir cualquier hipocalemia e hipomagnesemia según proceda.
- Evitar medicamentos no esenciales que prolonguen el intervalo QT. Si no se puede prescindir de ellos, realizar ECG con frecuencia.
- La dosis de VANFLYTA se debe reducir si se utiliza concomitantemente con inhibidores potentes de CYP3A.

Para más información, consulte la ficha técnica o resumen de las características del producto (RCP).

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas. Ver el prospecto para obtener información sobre cómo notificar las reacciones adversas.

Daiichi-Sankyo

ES 122205

TARJETA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

VANFLYTA®

quizartinib

- Lleve siempre esta tarjeta con usted.
- Esta tarjeta contiene información importante de seguridad que debe conocer antes de tomar VANFLYTA y durante el tratamiento con VANFLYTA.
- Enseñe esta tarjeta a cualquier médico, farmacéutico o cirujano antes de cualquier intervención médica o tratamiento.

Información del paciente

Nombre del paciente:

.....

Fecha de nacimiento:

.....

En caso de emergencia, póngase en contacto con:

Nombre: .....

Número de teléfono:

.....

Información sobre el tratamiento

(A completar por el médico o por el paciente)

Se ha prescrito VANFLYTA a una dosis una vez al día de:

..... mg

El tratamiento empezó en:

/ (MM/AA)

Información del médico prescriptor

(A completar por el médico o por el paciente)

Para más información o en caso de emergencia, póngase en contacto con:

Nombre del médico:

.....

Número de teléfono:

.....

Información importante para el paciente

VANFLYTA puede causar una actividad eléctrica anómala en su corazón llamada “intervalo QT largo”, que puede ocasionar un trastorno del ritmo cardiaco potencialmente mortal. Por lo tanto, es muy importante comprobar periódicamente la actividad eléctrica de su corazón con un electrocardiograma (ECG).

Póngase en contacto inmediatamente con su médico si:

- tiene sensación de mareo, de aturdimiento o de desmayo;
- siente un cambio en el ritmo del corazón, p. ej., palpitaciones o una anomalía en su pulso. Puede sentir que su corazón late demasiado deprisa, pero también puede sentir un cambio impreciso o menos específico;
- se ha desmayado o perdido el conocimiento, aunque fuera solo durante un periodo de tiempo muy breve, p. ej., unos segundos;