

Tarjeta para el paciente

ES

Eliquis®
(apixabán)

Usted/el niño/el cuidador deben llevar siempre consigo esta tarjeta
Muestre esta tarjeta al farmacéutico, dentista y cualquier otro profesional sanitario antes de un tratamiento.

Información para pacientes/cuidadores

- Tome/administre Eliquis de forma regular siguiendo las instrucciones. Si olvidó una dosis de la mañana, tómela/adminístrela en cuanto se acuerde y puede tomarla/administrarla junto con la dosis de la noche. Si se olvida una dosis de la noche, solo puede tomarla/administrarla durante esa misma noche. No tome/administre dos dosis a la mañana siguiente, sino que siga tomando/administrando el medicamento al día siguiente como de costumbre dos veces al día según lo recomendado.
- No interrumpa el tratamiento con Eliquis sin hablar primero con el médico, porque usted/el paciente estaría en riesgo de sufrir un ictus, un coágulo de sangre u otras complicaciones.

- Eliquis ayuda a hacer la sangre más fluida. Sin embargo, esto puede aumentar el riesgo de sangrado.
- Los síntomas y señales de sangrado incluyen hematomas o sangrado bajo la piel, heces de color negruzco, sangre en la orina, sangrado por la nariz, aturdimiento, cansancio, palidez o debilidad, dolor de cabeza repentino, tos con sangre o vómitos de sangre.
- En caso de presentar un sangrado que no cese por sí mismo, **busque atención médica de forma inmediata.**
- Si usted/el paciente necesita someterse a una cirugía u otro procedimiento invasivo, informe al médico que usted/el paciente está tomando Eliquis.

Julio 2025

Estoy recibiendo tratamiento anticoagulante con Eliquis (apixabán) para prevenir los coágulos sanguíneos

Información para profesionales sanitarios

- Eliquis (apixabán) es un anticoagulante oral que actúa por inhibición directa y selectiva del factor Xa.
- Eliquis puede aumentar el riesgo de sangrado. En caso de eventos de sangrado mayor, debe interrumpirse el tratamiento inmediatamente.
- El tratamiento con Eliquis no requiere monitorización rutinaria de exposición a apixabán. Un ensayo cuantitativo anti-factor Xa calibrado puede ser útil en situaciones excepcionales, por ejemplo sobredosis o cirugía de emergencia (no se recomiendan los ensayos de tiempo de protrombina (TP), Ratio Internacional Normalizado (INR) y el tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPa)) – ver Ficha Técnica. Está disponible en adultos un agente para revertir la actividad anti-factor Xa de apixabán; no obstante, no se ha establecido su seguridad y eficacia en pacientes pediátricos (consultar la ficha técnica de andexanet alfa).

Por favor, complete esta sección o pídale al médico que la complete

Nombre: _____
Fecha de nacimiento: _____
Indicación: _____
Peso: _____
Dosis: _____ mg dos veces al día
Nombre del médico: _____
Número de teléfono del médico: _____

 Bristol Myers Squibb

 Pfizer