

## ▼ LIVMARLI (MARALIXIBAT)

# GUÍA DE DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIRIGIDA A PACIENTES Y CUIDADORES

El objetivo de esta guía es informar al paciente o a la persona a cargo del paciente de la dosis y la forma de administración de Livmarli para evitar errores de dosificación.

Lleve consigo esta guía cada vez que visite a su médico.

Lea estos materiales conjuntamente con el prospecto del medicamento disponible en el interior del envase o en el Centro de Información online de medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (CIMA) <https://cima.aemps.es/>

**Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Enero 2025**

Disponible en la página web de la AEMPS: [www.aemps.gob.es](http://www.aemps.gob.es)

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante comunicar los efectos adversos que pudiera usted tener. Puede consultar la forma de hacerlo en el prospecto del medicamento

## **INSTRUCCIONES DE ADMINISTRACIÓN**

La dosis de Livmarli que le van a administrar depende de su peso corporal. Su médico calculará la dosis y le indicará cuánto debe tomar y qué tamaño de jeringa oral debe utilizar.

En esta guía, el médico registrará:

- su peso.
- la dosis de Livmarli que necesita.
- la cantidad (volumen) de medicamento en mililitros que se tiene que tomar.
- el número de tomas al día (una o dos veces al día)
- el tamaño de la jeringa que debe usar.
- fechas de tratamiento

Cómo tomarlo:

- Este medicamento se administra por vía oral utilizando la jeringa especial para medicamentos que viene dentro del envase.

Cuándo tomarlo:

- Tómelo antes de comer (hasta 30 minutos antes) o durante la comida.
- Si debe tomarlo una vez al día, hágalo por la mañana.
- Si debe tomarlo dos veces al día, tómelo por la mañana y por la noche.
- No diluya la solución oral con bebidas ni la mezcle con alimentos

### **¿Dónde puedo conseguir más información?**

Puede encontrar información sobre Livmarli en el prospecto para el paciente incluido con su medicamento. Es importante que lea este prospecto antes de que usted o el/la menor a su cargo inicie el tratamiento.

Si tiene alguna duda, consulte a su médico, enfermero o farmacéutico.



Fecha de inicio	Fecha de interrupción	Peso (kg)	Dosis de Livmarli®	Volumen que se debe administrar (ml) y frecuencia (una vez o dos veces al día)	Tamaño de la jeringa que se debe utilizar (0,5 ml/ 1 ml/ 3 ml)

**Comunicación de sospechas de efectos adversos:**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:

<https://www.notificaRAM.es>