

Se detetar algum destes sinais, informe o seu médico imediatamente. Caso tenha dúvidas sobre o seu tratamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.	É importante que informe imediatamente o médico que lhe prescreveu este medicamento sobre uma gravidez ou algum efeito indesejável que possa ocorrer durante o tratamento com Yuvanci. Centro de tratamento: Nome do médico prescriptor: Número de telefone do médico prescriptor:	 10 mg/20 mg 10 mg/40 mg comprimidos revestidos por película macitentano/tadalafil Para o tratamento da hipertensão arterial pulmonar PT Este cartão contém informação de segurança importante que precisa de saber quando está a receber tratamento com Yuvanci. Tenha este cartão sempre consigo e mostre-o a todos os médicos que lhe prestem cuidados de saúde.	Si experimenta cualquiera de estos signos, informe a su médico inmediatamente. Si tiene alguna duda sobre su tratamiento, consulte a su médico o farmacéutico.	Es importante que informe inmediatamente al médico prescriptor de cualquier signo de embarazo o efecto adverso que pueda producirse durante el tratamiento con Yuvanci. Centro de tratamiento: Nombre del médico prescriptor: Número de teléfono del médico prescriptor: PC5866 	 10 mg/20 mg 10 mg/40 mg comprimidos recubiertos con película macitentán/tadalafilo Para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar ES Esta tarjeta contiene información de seguridad importante que necesita conocer si recibe tratamiento con Yuvanci. Lleve siempre consigo esta tarjeta y muéstresela a cualquier médico que le atienda.
--	--	--	---	---	--

Embarazo Yuvanci puede afectar al desarrollo del feto. Por tanto, no debe tomar Yuvanci si está embarazada y tampoco debe quedarse embarazada mientras tome Yuvanci. Además, si usted padece hipertensión arterial pulmonar, el embarazo puede empeorar en gran medida los síntomas de su enfermedad. Anticoncepción Debe utilizar un método anticonceptivo fiable para el control de la natalidad (anticoncepción) durante el tratamiento con Yuvanci.	Consulte con su médico ante cualquier duda que pueda tener. Se debe realizar una prueba de embarazo antes de iniciar el tratamiento con Yuvanci y una vez al mes durante el tratamiento, incluso si usted piensa que no está embarazada. Al igual que otros medicamentos de este grupo, Yuvanci puede tener efectos en el hígado. El médico le realizará análisis de sangre antes de empezar el tratamiento con Yuvanci y durante el tratamiento para comprobar si su hígado funciona correctamente.	Los signos indicativos de que su hígado puede no estar funcionando correctamente son: • náuseas (necesidad de vomitar) • vómitos • fiebre (temperatura elevada) • dolor de estómago (abdomen) • ictericia (coloración amarillenta de la piel o el blanco de los ojos) • orina de color oscuro • picor en la piel • letargo o fatiga (cansancio o agotamiento inusuales) • síndrome pseudogripal (dolor articular o muscular con fiebre)	Gravidez Yuvanci pode prejudicar o desenvolvimento do feto. Por este motivo, não pode tomar Yuvanci se estiver grávida e também não pode engravidar enquanto estiver a tomar Yuvanci. Além disso, se sofre de hipertensão arterial pulmonar, a ocorrência de uma gravidez pode deteriorar gravemente os sintomas da sua doença. Contraceção Necessita de utilizar um método contraceptivo fiável enquanto estiver a tomar Yuvanci.	Assegure-se de que fala com o seu médico sobre quaisquer dúvidas que possa ter. Deve fazer um teste de gravidez antes de iniciar Yuvanci e todos os meses durante o tratamento, mesmo que pense que não está grávida. Como outros medicamentos desta classe, Yuvanci pode afetar o fígado. O seu médico irá fazer-lhe análises ao sangue antes de iniciar o tratamento com Yuvanci e durante o tratamento, para verificar se o seu fígado está a funcionar bem.	Os sinais de que o seu fígado pode não estar a funcionar bem incluem: • náuseas (vontade de vomitar) • vómitos • febre (temperatura alta) • dor no estômago (abdómen) • icterícia (amarelecimento da pele ou da parte branca dos olhos) • urina de cor escura • comichão na pele • letargia ou fadiga (cansaço ou exaustão invulgar) • síndrome gripal (dores musculares e das articulações com febre)
---	---	--	--	--	---