

Tarjeta de información para la paciente

Información importante para las pacientes femeninas que pueden quedarse embarazadas

WELIREG® (belzutifán)



No se debe quedar embarazada mientras tome WELIREG. Si está embarazada:

- No tome WELIREG para la enfermedad de Von Hippel-Lindau.
- Hable con su médico sobre el uso de WELIREG para el tratamiento del carcinoma de células renales.
- WELIREG puede dañar al bebé en su vientre y provocar un aborto espontáneo.
- Hable con su médico inmediatamente si está embarazada, cree que está embarazada, se queda embarazada

o quiere quedarse embarazada, antes y durante el tratamiento con WELIREG.

- Su médico le hará una prueba de embarazo antes de que empiece a tomar WELIREG.

Anticoncepción (prevención del embarazo)

- Los métodos anticonceptivos que contienen hormonas - como píldoras anticonceptivas, inyecciones o parches transdérmicos - pueden no funcionar tan bien mientras se está tomando WELIREG.
- Utilice un método anticonceptivo fiable sin hormonas o haga que su pareja masculina use un preservativo para prevenir el embarazo. Haga esto mientras esté tomando WELIREG y hasta al menos una semana después de la última dosis.
- Hable con su médico o farmacéutico sobre los métodos anticonceptivos que pueden ser adecuados para usted.

Para más información, lea detenidamente el prospecto.

Detalles de contacto importantes

Mi nombre _____

Nombre de mi médico _____

Teléfono de la consulta _____