

Lea esta tarjeta de información junto con el prospecto del medicamento que se encuentra en el interior del envase. El prospecto también se encuentra disponible en el Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS (CIMA): <https://cima.aemps.es/>

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaRAM.es>

Version 1.0

TARJETA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Ogsiveo® (nirogacestat)

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Marzo - 2026

Disponible en la página web de la AEMPS
www.aemps.gob.es

- **Esta tarjeta contiene información importante de seguridad que usted debe tener en cuenta.**
- **Lleve esta tarjeta consigo en todo momento.**
- **Muestre esta tarjeta a cualquier profesional sanitario que le atienda, (p.ej., cuando acuda a urgencias).**

Embarazo

- No tome este medicamento si está embarazada. Ogsiveo puede causar daños al feto, incluido un aborto, si se toma durante el embarazo.
- Si usted es una mujer que puede quedarse embarazada, su médico comprobará si está embarazada antes de empezar el tratamiento. También le harán pruebas de embarazo durante el tratamiento si ha dejado de tener la regla o tiene un sangrado menstrual inusual.
- Si sospecha que puede estar embarazada, informe inmediatamente a su médico. Si se queda embarazada, debe dejar de tomar Ogsiveo.

Anticoncepción en hombres y mujeres

- Si usted es una mujer que puede quedarse embarazada o un hombre con una pareja que puede quedarse embarazada, debe utilizar al menos un método anticonceptivo altamente eficaz (por ejemplo, un dispositivo intrauterino) o dos métodos anticonceptivos complementarios, incluido un método de barrera, durante el tratamiento y durante 1 semana después de la última dosis.
- Hable con su médico sobre los métodos anticonceptivos que pueden ser más adecuados para usted.