

▼ Teizeild[®] (teplizumab)

Guía para pacientes y cuidadores

En ella se incluye información importante sobre el tratamiento con TEIZEILD[®] y algunos efectos adversos graves que podrían ocurrir, como:

- **Síndrome de liberación de citocinas (SLC)**
- **Linfopenia**
- **Infecciones graves**

Lea esta guía junto al prospecto del medicamento, disponible en <https://cima.aemps.es> para disponer de la información completa del medicamento.

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Mayo 2026

Disponible en la página web de la AEMPS www.aemps.gob.es.

Antes de comenzar el tratamiento con teplizumab

Antes de empezar el tratamiento con teplizumab, su médico le realizará análisis de sangre para verificar:

- que su hígado funciona correctamente
- que sus recuentos de células en sangre son adecuados
- que no tiene signos sugestivos de una infección reciente por mononucleosis (causada por el virus de Epstein-Barr) o citomegalovirus
- y que no presenta una infección activa grave o crónica en ese momento.

¿Qué debo hacer?

Informe a su médico:

- Si está enfermo o se enferma con frecuencia

¿Qué debo hacer?


Informe a su médico:

- Si ha recibido alguna vacuna recientemente o si tiene previsto recibir cualquier vacuna

Teplizumab es un medicamento que puede cambiar el funcionamiento de las vacunas en su organismo.

Su médico le dirá cuándo debe recibir una vacuna antes o después de tomar teplizumab.

Para algunas vacunas, es posible que tenga que esperar hasta 1 año después de tomar teplizumab para poder recibirlas.



Durante y después del tratamiento

- Su médico le hará análisis de sangre para verificar que todo va bien.
- Su médico podría pausar o interrumpir el tratamiento con teplizumab si tiene:
 - Problemas hepáticos
 - Una infección grave
 - Recuentos sanguíneos bajos que no mejoran

¿Qué efectos adversos graves podrían producirse con teplizumab?

Síndrome de liberación de citocinas (SLC)

Se ha observado síndrome de liberación de citocinas (SLC) en pacientes tratados con teplizumab. En este síndrome se liberan sustancias llamadas citoquinas que ayudan a combatir infecciones, pero en grandes cantidades **pueden causar síntomas y signos como:**

- Fiebre
- Náuseas
- Cansancio
- Dolor de cabeza
- Dolor muscular (mialgia)
- Dolor articular (artralgia)
- Aumento de las enzimas hepáticas en la sangre

Estos signos y síntomas pueden comenzar durante los primeros 5 días de tratamiento

¿Qué hará su médico? ¿Qué debe hacer usted?

Su médico le tratará con medicamentos para prevenir/reducir el dolor y la fiebre (como ibuprofeno, naproxeno o paracetamol), las alergias y las náuseas durante los primeros cinco días de tratamiento.

- Estos medicamentos ayudan a prevenir/reducir la fiebre, sensación de cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular y articular o malestar, las alergias y las náuseas.

Se podrían administrar dosis adicionales más allá de los primeros cinco días si fuera necesario.

- **Informe a su médico o acuda a un centro sanitario de inmediato** si desarrolla algún signo o síntoma de SLC durante su tratamiento con teplizumab.
- **Durante su tratamiento, su médico le hará análisis de sangre** para comprobar sus enzimas hepáticas.
- **Si desarrolla problemas hepáticos, su médico puede interrumpir o suspender definitivamente su tratamiento.**

¿Qué efectos adversos graves podrían producirse con teplizumab?

Disminución de los glóbulos blancos (linfopenia)

Teplizumab puede reducir el recuento de linfocitos, un tipo de glóbulos blancos que ayudan a combatir las infecciones.

Este es un efecto adverso grave pero frecuente. Suele ocurrir después de su primera dosis de teplizumab. Los glóbulos blancos generalmente comienzan a volver a la normalidad después de la quinta dosis.

En algunas personas, los glóbulos blancos pueden permanecer bajos durante más tiempo o caer más de lo habitual.

¿Qué hará su médico? ¿Qué debe hacer usted?

- **Durante el tratamiento, su médico le realizará análisis de sangre** para revisar los niveles de sus glóbulos blancos.
- **Si los niveles de estos glóbulos permanecen demasiado bajos, su médico puede interrumpir o suspender definitivamente su tratamiento con teplizumab.**

¿Qué efectos adversos graves podrían producirse con teplizumab?

Infecciones graves

Teplizumab puede hacer que su sistema inmunológico sea menos efectivo para luchar contra infecciones.

En algunos pacientes que han recibido teplizumab, se han presentado infecciones causadas por bacterias y virus.

Los síntomas de infección pueden incluir los siguientes:

- Fiebre
- Escalofríos
- Cansancio
- Náuseas
- Vómitos
- Tos
- Falta de aliento
- Dolor en el pecho
- Ganglios linfáticos hinchados o bulto doloroso que se siente caliente (absceso).

¿Qué hará su médico? ¿Qué debe hacer usted?

- **Antes de que le administren teplizumab informe a su médico** si tiene una infección grave o una infección que no se cura o que vuelve a aparecer.
- Si nota signos o síntomas de una infección grave mientras está en tratamiento con teplizumab, **contacte con su médico o busque atención médica de inmediato.**
- Su médico **le dará el tratamiento adecuado** para la infección e interrumpirá **su tratamiento con teplizumab.**



