

TARJETA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE IMDYLLTRA® (tarlatamab)

A COMPLETAR POR EL MÉDICO PRESCRIPTOR

Nombre del paciente:

Fecha de inicio de tratamiento con IMDYLLTRA®

Nombre del médico prescriptor / número de teléfono

Nombre del Hospital

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Mayo 2026

Disponible en la página web de la AEMPS www.aemps.gob.es

INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES SANITARIOS

- Este paciente ha recibido IMDYLLTRA (tarlatamab), el cual puede causar **síndrome de liberación de citoquinas (SLC) y síndrome de neurotoxicidad asociada a células inmuno efectoras (ICANS)**.
- Estas reacciones adversas pueden ser graves y potencialmente mortales. Para más información, consulte la ficha técnica del medicamento en el Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS (CIMA): <https://cima.aemps.es>
- **Si el paciente presenta alguno de los síntomas indicados en esta tarjeta, póngase en contacto inmediatamente con el médico prescriptor.**

INFORMACIÓN PARA PACIENTES/CUIDADORES

- **Lleve esta tarjeta con usted en todo momento.**
- **Muestre esta tarjeta a cualquier profesional sanitario que le atienda, incluso si acude a Urgencias.**

Recuerde:

Debe permanecer cerca de un centro sanitario (por ejemplo, donde recibe este tratamiento) durante las 24 horas siguientes al inicio de cada perfusión en el Día 1 y el Día 8, acompañado por un cuidador.

NO conduzca ni maneje maquinaria si presenta síntomas neurológicos, como mareo, convulsiones o confusión, hasta que dichos síntomas se resuelvan.

Lea esta tarjeta junto con el prospecto del medicamento. Ambos documentos se encuentran disponibles en el Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS (CIMA) en el siguiente enlace: <https://cima.aemps.es>

IMDYLLTRA, como todos los medicamentos, puede causar efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Algunos efectos adversos pueden ser graves y/o potencialmente mortales, como el síndrome de liberación de citocinas (SLC) y el síndrome de neurotoxicidad asociada a células inmuno efectoras (ICANS).

Llame a su médico responsable del tratamiento con IMDYLLTRA o busque atención médica de urgencia inmediatamente si presenta cualquiera de estos signos y síntomas:

1.- Relacionados con SLC:

- Fiebre (38°C o superior)
- Presión arterial baja
- Mareo
- Escalofríos
- Latido rápido del corazón
- Dolor de cabeza intenso
- Dificultad para respirar
- Falta de aliento
- Náuseas o vómitos

2.- Relacionados con ICANS:

- Confusión
- Dificultad para hablar
- Pérdida de memoria
- Desorientación
- Nivel de consciencia disminuido
- Dolor de cabeza intenso
- Pérdida del equilibrio
- Debilidad o entumecimiento
- Temblores
- Convulsiones

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaRAM.es>