

Guía del paciente en tratamiento con ▼ Enjaymo (sutimlimab)

▼ *Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante comunicar los efectos adversos que pudiera usted tener. Puede consultar la forma de hacerlo en el prospecto del medicamento*

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) - septiembre 2023

Disponible en la página web de la AEMPS www.aemps.gob.es

Qué necesita saber sobre Enjaymo (sutimlimab)

Riesgo de infección con el tratamiento con Enjaymo

Enjaymo ayuda a prevenir la ruptura de los glóbulos rojos al dirigirse a una parte del sistema inmunitario conocida como vía del complemento. Esta vía sirve normalmente para ayudar a eliminar las infecciones del cuerpo. Por lo tanto, el tratamiento con este medicamento puede disminuir los mecanismos que tiene su organismo para enfrentarse a las infecciones graves (como la neumonía o el síndrome séptico) y las infecciones meningocócicas.



Vacunación

Antes de recibir el tratamiento con Enjaymo, el médico le informará acerca de la importancia de que se vacune. Recibir una vacuna contra ciertas infecciones bacterianas puede ayudar a reducir el riesgo de contraer estas infecciones, pero es posible que no las prevenga.

- Consulte con el médico si está vacunado adecuadamente de conformidad con las recomendaciones actuales y también si ha recibido vacunas antimeningocócicas y antineumocócicas.
- Se recomienda la inoculación de vacunas antimeningocócicas y antineumocócicas al menos 2 semanas antes de recibir la primera dosis de Enjaymo si nunca se ha vacunado antes.
- En el caso de que se haya vacunado con anterioridad, deberá recibir una dosis de refuerzo. Su médico le aconsejará sobre si necesita vacunas adicionales.
- Si el médico decide que es necesario un tratamiento urgente con este medicamento, se le vacunará lo antes posible después de recibir el tratamiento.

Qué necesita saber sobre Enjaymo (sutimlimab)



Síntomas y signos de infecciones que debe conocer

Informe al médico si tiene alguna infección, incluida una infección en curso como VIH, hepatitis B o hepatitis C.

Durante el tratamiento con Enjaymo, informe al médico lo antes posible si sospecha que puede tener una infección o presentar cualquiera de los siguientes síntomas que podrían ser síntomas de una infección:

- Fiebre con o sin erupción cutánea
- Escalofríos
- Síntomas seudogripales
- Tos o dificultad para respirar
- Dolor de cabeza con náuseas, vómitos, rigidez de cuello, rigidez de espalda
- Confusión
- Sensibilidad ocular a la luz
- Dolor al orinar o necesidad de orinar con más frecuencia

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:
<http://www.notificaRAM.es>