



ORENCIA® Tarjeta de información para el paciente en tratamiento con ORENCIA

Esta tarjeta contiene información importante de seguridad que necesita conocer antes de administrarle ORENCIA y durante el tratamiento con ORENCIA.

- Muestre esta tarjeta a los médicos que le estén llevando el tratamiento.

Infecciones

ORENCIA aumenta el riesgo de contraer infecciones.

- No debe ser tratado con ORENCIA si tiene una infección grave.
- Se deben descartar determinadas infecciones antes del tratamiento con ORENCIA.

Tuberculosis (TB): Debe someterse a las pruebas de TB antes del tratamiento con ORENCIA.

Es muy importante que le diga a su médico si tuvo alguna vez TB, o si ha estado en contacto con alguien que haya tenido TB.

Hepatitis: Los tratamientos antirreumáticos se han asociado con la reactivación de hepatitis B. Debe someterse a las pruebas de hepatitis viral de acuerdo a las guidelines publicadas.

Infecciones

- Si tiene síntomas que sugieren infecciones, como fiebre, tos persistente, pérdida de peso, o cansancio, debe ponerse en contacto con su médico inmediatamente.

Reacciones alérgicas

Después del uso de ORENCIA se pueden producir reacciones alérgicas. Si usted presenta síntomas como opresión en el pecho, silbidos, vértigo intenso, o mareo, busque atención médica de forma inmediata.

Fechas del tratamiento con ORENCIA:

Inicio: _____ Último tratamiento: _____

- Para más información, lea el prospecto de ORENCIA.
- Cuando vaya al médico, asegúrese de llevar anotados todos los demás medicamentos que esté tomando.

Nombre del paciente: _____ Nombre del médico: _____

Teléfono del médico: _____

Guarde esta tarjeta durante 3 meses desde la última dosis de ORENCIA, ya que las reacciones adversas pueden aparecer un tiempo después de la última dosis de ORENCIA.

ORENCIA no se debe utilizar en mujeres embarazadas a no ser que sea estrictamente necesario.

Si le han administrado ORENCIA durante su embarazo, es importante que informe al personal sanitario sobre su bebé antes de que le administren cualquier vacuna. Su bebé podría estar en riesgo de padecer una infección grave provocada por "vacunas vivas" durante 14 semanas desde su última administración de ORENCIA.

Septiembre 2020