

Nombre del paciente:

Nombre del médico:

Número de teléfono del médico:

Fecha de inicio del tratamiento con Remsima:

Administraciones actuales:

Cuando vaya al médico, asegúrese también de llevar anotados todos los demás medicamentos que esté usando.

Lista de otros medicamentos:

Lista de alergias:

Solicite a su médico que anote a continuación el tipo y la fecha de la(s) última(s) prueba(s) de detección de tuberculosis (TB):

Prueba:

Fecha:

Resultado:

Es importante que usted y su médico anoten el nombre comercial y el número de lote de su medicamento.

Nombre comercial:

Número de lote:

TARJETA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Remsima™
infliximab

Lea detenidamente el prospecto, disponible en el Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS (CIMA): <https://cima.aemps.es>

Muestre esta tarjeta a cualquier médico que le esté tratando.

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) Septiembre 2026

Disponible en la página web de la AEMPS:
www.aemps.gob.es

Esta tarjeta de información para el paciente contiene información de seguridad importante que necesita conocer antes y durante el tratamiento con Remsima.

Cuando empiece una nueva tarjeta, guarde esta tarjeta a modo de referencia durante 4 meses tras su última dosis de Remsima.

Lea detenidamente el Prospecto de Remsima antes de empezar a usar este medicamento.

Conserve esta tarjeta durante 4 meses después de su última dosis de Remsima, o en caso de embarazo durante 12 meses después del nacimiento de su bebé. Los efectos adversos se pueden producir mucho tiempo después de la última dosis.

| INFECCIONES |

Antes del tratamiento con Remsima

- Informe a su médico si tiene una infección, aunque sea de poca importancia.
- Es muy importante que informe a su médico si alguna vez ha tenido tuberculosis (TB), o si ha estado en contacto cercano con alguien que haya tenido TB. Su médico le hará una prueba para ver si tiene TB. Solicite a su médico que anote el tipo y fecha de su(s) última(s) prueba(s) de detección de TB en la tarjeta.
- Informe a su médico si tiene hepatitis B o si conoce o sospecha que es portador del virus de hepatitis B.

Durante el tratamiento con Remsima

- Informe a su médico inmediatamente si tiene signos de una infección, como fiebre, sensación de cansancio, tos (persistente), dificultad para respirar, pérdida de peso, sudores nocturnos, diarrea, heridas, problemas dentales, escozor al orinar o síntomas parecidos a la gripe.

| EMBARAZO, LACTANCIA Y VACUNAS |

- En el caso de que haya recibido Remsima durante el embarazo o si está en periodo de lactancia, es importante que informe al médico de su bebé antes de que su bebé reciba alguna vacuna. Su bebé no debe recibir una “vacuna de microorganismos vivos”, como la BCG (utilizada para prevenir la tuberculosis) dentro de los 12 meses después del nacimiento o mientras usted esté en periodo de lactancia a menos que el médico de su bebé recomiende otra cosa.

| INTOLERANCIA HEREDITARIA A LA FRUCTOSA |

Remsima 100 mg y 350 mg concentrado para solución para perfusión contiene sorbitol. Si usted padece intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF), no debe recibir esta formulación por vía intravenosa.

Informe a su médico si tiene intolerancia hereditaria a la fructosa. En ese caso, existen otras formulaciones intravenosas de infliximab adecuadas.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es