

CONTROLA TU INYECCIÓN

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Información contacto urgente

EESZYA0080a

Lilly

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS PACIENTES

A veces ZypAdhera puede entrar en el torrente sanguíneo muy rápidamente y puede producir los siguientes efectos adversos: somnolencia excesiva, mareos, confusión, desorientación, dificultad al hablar, dificultad al andar, rigidez muscular o temblores, debilidad, irritabilidad, agresión, ansiedad, incremento de la presión sanguínea, o convulsiones y puede producir pérdida de conciencia. **Por esa razón:**

- Cada vez que reciba su inyección su médico o enfermera observará la aparición de los síntomas listados durante al menos 3 horas.
- Su médico o enfermera debe asegurarse que no tiene ninguno de esos síntomas antes de irse.
- Aunque es poco probable, usted puede tener esos síntomas después de las 3 horas tras la inyección. Si eso pasa, contacte con su médico o enfermera inmediatamente.
- Debido a este riesgo, no conduzca ni utilice maquinaria durante el resto del día en el que recibe la inyección.

Mientras está en la consulta, asegúrese de decirle a su médico o enfermera si usted:

- Se siente muy somnoliento.
- Se siente mareado.
- Se siente confuso o desorientado.
- Se siente irritable o agresivo.
- Se siente con ansiedad.
- Tiene dificultad para hablar o andar.
- Se siente débil.
- Tiene rigidez muscular o temblores.

Su médico o enfermera debe comprobar y asegurarse que usted está alerta y sin síntomas antes de irse de la consulta y deben explicarle qué hacer en caso de que esto ocurra una vez que se haya ido.

Puede encontrar información adicional de ZypAdhera en el prospecto.

ZYPAdhera.

Polvo y disolvente para suspensión
inyectable de liberación prolongada
Olanzapina

INDICACIÓN

Tratamiento de mantenimiento
de pacientes adultos con
esquizofrenia suficientemente
estabilizados durante
el tratamiento agudo
con olanzapina oral

Lilly