

Generalmente, los síntomas de la LMP se desarrollan más lentamente que los que se asocian a un brote de EM (a lo largo de días o semanas).

Algunos de los síntomas de la LMP son los siguientes:

- cambios en la habilidad mental y en la capacidad de concentración,
- cambios de humor o de comportamiento,
- pérdidas de memoria,
- dificultades en el habla y en la comunicación
- debilidad en un lado del cuerpo,
- problemas de visión,
- aparición de nuevos síntomas neurológicos, es decir, de síntomas que el paciente antes no tenía.

El manejo de la LMP requiere que Tysabri sea eliminado de la sangre y esto es algo que se realiza normalmente aplicando un tratamiento conocido con el nombre de "plasmaféresis".

Sepa también que hay pacientes, que a los pocos días o semanas de haber recibido tratamiento para la LMP (y eliminación de Tysabri), pueden presentar una reacción inflamatoria grave conocida como SIRI

(Síndrome Inflamatorio de Reconstitución Inmunológica). El SIRI puede producir síntomas variados en el paciente, incluyendo el empeoramiento de su función neurológica.

Otras infecciones graves

Mientras se encuentra en tratamiento con Tysabri podría sufrir otras infecciones graves. Consulte a su médico lo antes posible si presenta síntomas como por ejemplo fiebre persistente que hagan pensar que puede estar sufriendo una infección.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaRAM.es>.



Tarjeta de Información para el paciente que se encuentra en tratamiento con ▼ Tysabri (natalizumab)

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS), noviembre 2017

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es

(▼) Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante comunicar los efectos adversos que pudiera usted tener. Puede consultar la forma de hacerlo en el prospecto del medicamento.

Tarjeta de Información para el paciente que se encuentra en tratamiento con ▼ Tysabri (natalizumab)

Nombre del paciente:

Nombre del médico:

Teléfono del médico:

Fecha de inicio del tratamiento:

Esta tarjeta contiene información sobre la seguridad de Tysabri. Léala con atención antes de comenzar el tratamiento y tenga muy en cuenta todo lo que en ella se explica:

- Conserve esta tarjeta hasta que hayan transcurrido 6 meses después de haber tomado la última dosis del medicamento ya que hay efectos secundarios que pueden producirse durante ese periodo de tiempo.
- Lea detenidamente el prospecto de Tysabri antes de comenzar a tomarlo.
- Muestre esta tarjeta a todos los médicos que participen en su tratamiento, no sólo a su neurólogo.

• Muéstresela también a las personas con las que conviva (por ejemplo su pareja o sus cuidadores) y dígalas que la lean detenidamente. Es importante que las personas de su alrededor estén al tanto de que está tomando este medicamento ya que de ese modo podrán adoptar una actitud vigilante ante los síntomas de la LMP (por ejemplo, pérdida de memoria y dificultades en el habla y en la comunicación). Hay veces que estos síntomas pasan desapercibidos para el propio paciente pero pueden ser detectados por las personas que están en contacto con ellos. No olvide que los síntomas de LMP pueden aparecer hasta 6 meses después de haber finalizado el tratamiento con Tysabri.

Aspectos a tener en cuenta antes de iniciar el tratamiento con Tysabri

- No debe recibir tratamiento con este medicamento si padece algún problema grave del sistema inmunitario.
- No debe tomar ninguna otra medicación a largo plazo (es decir durante un periodo prolongado de tiempo) para su esclerosis múltiple mientras este siendo tratado con Tysabri.

Aspectos a tener en cuenta durante el tratamiento con Tysabri

Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva (LMP)

La LMP es una infección poco frecuente que afecta al cerebro y que puede desarrollarse en pacientes que se encuentran en tratamiento con Tysabri. La LMP suele provocar discapacidad grave y en determinadas ocasiones puede conducir al fallecimiento del paciente. El riesgo de sufrir esta infección parece aumentar con la duración del tratamiento, especialmente a partir de los 2 años.

Los síntomas de la LMP pueden ser similares a los de un brote de esclerosis múltiple (EM), por consiguiente, si cree que su EM está empeorando, o si advierte que aparecen síntomas nuevos mientras está en tratamiento con Tysabri o durante los 6 meses después de haber terminado el mismo, es muy importante que informe a su médico lo antes posible.