Tarjetas de control de dosis:

Instanyl (Fentanilo): Multidosis

50 microgramos/dosis pulverizador nasal

Tarjeta de control de dosis:

Nº de dosis prescritas: ☐ 10 ☐ 40

Episodio de dolor (Día y hora)	¿Utilizó una segunda dosis para tratar el episodio de dolor? (Sí/No y hora)	Nº de dosis por episodio de dolor (1 ó 2)	Nº de dosis que le quedan en el envase

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Marzo 2018

Instanyl (Fentanilo): Multidosis

Tarjeta de control de dosis:

Haga un seguimiento del número de dosis que se aplica de Instanyl®

Llevar un registro de las dosis de Instanyl® aplicadas, le ayudará a calcular con facilidad cuántas dosis ha usado y cuántas le quedan en su pulverizador nasal. Como Instanyl® está disponible en tres concentraciones distintas, existen tres tipos de tarjetas con un código de color diferente para cada una de ellas (50 microgramos/dosis, 100 microgramos/dosis y 200 microgramos/dosis). Antes de iniciar el seguimiento de uso de Instanyl®, por favor, elija la tarjeta que corresponda con la dosis que le han prescrito y, a continuación, marque en ella el tamaño del envase correspondiente (10 dosis ó 40 dosis). Cada vez que use su pulverizador nasal Instanyl®, asegúrese de que usted o su cuidador rellenan la información correspondiente en la tarjeta, tal y como se puede ver en el ejemplo. Cuando calcule que le quedan cinco dosis o menos, póngase inmediatamente en contacto con su médico.



1. Utilice la tarjeta de control de dosis que corresponda con la concentración de Instanyl® que le ha prescrito su médico (50 microgramos/dosis, 100 microgramos/dosis o 200 microgramos/dosis).
2. Marque en este espacio el número de dosis del envase que le ha prescrito su médico (10 ó 40).
3. Introduzca en esta columna el dia y la hora en la que ha sufrido un episodio de dolor irruptivo.
4. ¿Tuvo que aplicarse una segunda dosis para ese episodio? Introduzca en esta columna SI/No, así como la hora de la aplicación en caso afirmativo.
5. Introduzca en esta columna el número de dosis que ha utilizado para controlar ese episodio de dolor irruptivo.
6. Para llevar un control de las dosis que le quedan en el pulverizador nasal, reste el número de dosis utilizadas para ese episodio del valor de la fila de arriba.
7. Cuando le quedan cinco dosis o menos, por favor, póngase inmediatamente en contacto con su médico con el fin de llevar un control adecuado de su dolor irruptivo.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaRAM.es

Tarjetas de control de dosis:

Instanyl (Fentanilo): Multidosis

100 microgramos/dosis pulverizador nasal

Tarjeta de control de dosis:

Nº de dosis prescritas: ☐ 10 ☐ 40

Episodio de dolor (Día y hora)	¿Utilizó una segunda dosis para tratar el episodio de dolor? (Sí/No y hora)	Nº de dosis por episodio de dolor (1 ó 2)	Nº de dosis que le quedan en el envase

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Marzo 2018

Instanyl (Fentanilo): Multidosis

Tarjeta de control de dosis:

Haga un seguimiento del número de dosis que se aplica de Instanyl®

Llevar un registro de las dosis de Instanyl® aplicadas, le ayudará a calcular con facilidad cuántas dosis ha usado y cuántas le quedan en su pulverizador nasal. Como Instanyl® está disponible en tres concentraciones distintas, existen tres tipos de tarjetas con un código de color diferente para cada una de ellas (50 microgramos/dosis, 100 microgramos/dosis y 200 microgramos/dosis). Antes de iniciar el seguimiento de uso de Instanyl®, por favor, elija la tarjeta que corresponda con la dosis que le han prescrito y, a continuación, marque en ella el tamaño del envase correspondiente (10 dosis ó 40 dosis). Cada vez que use su pulverizador nasal Instanyl®, asegúrese de que usted o su cuidador rellenan la información correspondiente en la tarjeta, tal y como se puede ver en el ejemplo. Cuando calcule que le quedan cinco dosis o menos, póngase inmediatamente en contacto con su médico.



1. Utilice la tarjeta de control de dosis que corresponda con la concentración de Instanyl® que le ha prescrito su médico (50 microgramos/dosis, 100 microgramos/dosis o 200 microgramos/dosis).
2. Marque en este espacio el número de dosis del envase que le ha prescrito su médico (10 ó 40).
3. Introduzca en esta columna el dia y la hora en la que ha sufrido un episodio de dolor irruptivo.
4. ¿Tuvo que aplicarse una segunda dosis para ese episodio? Introduzca en esta columna SI/No, así como la hora de la aplicación en caso afirmativo.
5. Introduzca en esta columna el número de dosis que ha utilizado para controlar ese episodio de dolor irruptivo.
6. Para llevar un control de las dosis que le quedan en el pulverizador nasal, reste el número de dosis utilizadas para ese episodio del valor de la fila de arriba.
7. Cuando le quedan cinco dosis o menos, por favor, póngase inmediatamente en contacto con su médico con el fin de llevar un control adecuado de su dolor irruptivo.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaRAM.es

Tarjetas de control de dosis:

Instanyl (Fentanilo): Multidosis

200 microgramos/dosis pulverizador nasal

Tarjeta de control de dosis:

Nº de dosis prescritas: ☐ 10 ☐ 40

Episodio de dolor (Día y hora)	¿Utilizó una segunda dosis para tratar el episodio de dolor? (Sí/No y hora)	Nº de dosis por episodio de dolor (1 ó 2)	Nº de dosis que le quedan en el envase

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Marzo 2018

Instanyl (Fentanilo): Multidosis

Tarjeta de control de dosis:

Haga un seguimiento del número de dosis que se aplica de Instanyl®

Llevar un registro de las dosis de Instanyl® aplicadas, le ayudará a calcular con facilidad cuántas dosis ha usado y cuántas le quedan en su pulverizador nasal. Como Instanyl® está disponible en tres concentraciones distintas, existen tres tipos de tarjetas con un código de color diferente para cada una de ellas (50 microgramos/dosis, 100 microgramos/dosis y 200 microgramos/dosis). Antes de iniciar el seguimiento de uso de Instanyl®, por favor, elija la tarjeta que corresponda con la dosis que le han prescrito y, a continuación, marque en ella el tamaño del envase correspondiente (10 dosis ó 40 dosis). Cada vez que use su pulverizador nasal Instanyl®, asegúrese de que usted o su cuidador rellenan la información correspondiente en la tarjeta, tal y como se puede ver en el ejemplo. Cuando calcule que le quedan cinco dosis o menos, póngase inmediatamente en contacto con su médico.



1. Utilice la tarjeta de control de dosis que corresponda con la concentración de Instanyl® que le ha prescrito su médico (50 microgramos/dosis, 100 microgramos/dosis o 200 microgramos/dosis).
2. Marque en este espacio el número de dosis del envase que le ha prescrito su médico (10 ó 40).
3. Introduzca en esta columna el dia y la hora en la que ha sufrido un episodio de dolor irruptivo.
4. ¿Tuvo que aplicarse una segunda dosis para ese episodio? Introduzca en esta columna SI/No, así como la hora de la aplicación en caso afirmativo.
5. Introduzca en esta columna el número de dosis que ha utilizado para controlar ese episodio de dolor irruptivo.
6. Para llevar un control de las dosis que le quedan en el pulverizador nasal, reste el número de dosis utilizadas para ese episodio del valor de la fila de arriba.
7. Cuando le quedan cinco dosis o menos, por favor, póngase inmediatamente en contacto con su médico con el fin de llevar un control adecuado de su dolor irruptivo.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaRAM.es