

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

VANCOMICINA ACCORD 500 mg IV EFG

VANCOMICINA ACCORD 1 g IV EFG

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

VANCOMICINA ACCORD 500 mg

cada vial contiene: Vancomicina (D.C.I) (clorhidrato.).....500 mg

VANCOMICINA ACCORD 1 g

cada vial contiene: Vancomicina (D.C.I) (clorhidrato.).....1 g

3. FORMA FARMACÉUTICA

Polvo liofilizado para administración intravenosa.

4. DATOS CLÍNICOS

4.1.Indicaciones terapéuticas:

1. Tratamiento de infecciones graves producidas por microorganismos grampositivos resistentes a los antibióticos beta-lactámicos, entre las que cabe destacar:

- Abscesos cerebrales
- Endocarditis bacteriana
- Infecciones óseas
- Erisipela
- Meningitis
- Septicemia

Vancomicina es el antibiótico de elección en el tratamiento de las infecciones graves por:

Staphylococcus aureus meticilin resistente (MRSA), *Staphylococcus coagulasa* negativos, incluido *Staphylococcus epidermidis* (MRSE) y *Enterococcus spp.* resistentes a penicilinas.

Puede realizarse tratamiento empírico cuando se sospecha infección por uno de estos microorganismos antes de conocerse el resultado del antibiograma.

2. Vancomicina es una alternativa a los antibióticos beta-lactámicos en el tratamiento de infecciones graves producidas por microorganismos grampositivos en pacientes alérgicos a estos antibióticos.

3. Profilaxis quirúrgica en ciertas intervenciones que comporten la implantación de material protésico en un entorno de alta incidencia de infecciones causadas por *Staphylococcus* meticillin resistentes.

4. Se recomienda el uso de vancomicina en la profilaxis de la endocarditis bacteriana en pacientes de alto-riesgo alérgicos a los antibióticos beta-lactámicos y que vayan a ser sometidos a ciertos procedimientos dentales o quirúrgicos.

5. La forma parenteral puede ser administrada por vía oral en el tratamiento de la colitis pseudomembranosa y enterocolitis estafilocócica asociadas a antibióticos en aquellos casos graves en los que esté en peligro la vida del paciente y cuando fracase el tratamiento con metronidazol. Vancomicina no es eficaz por vía oral en el tratamiento de otro tipo de infecciones.

4.2. Posología y Forma de administración

Adultos

La dosis inicial se ajustará en función del peso corporal (30 - 50 mg/kg/día). La pauta posológica habitual en adultos con la función renal normal es de 1 g/12 horas ó de 500 mg/6 horas.

Niños

En los niños la dosis inicial es de 10 mg/kg/6 horas (dosis total diaria de 40 mg/kg de peso). En prematuros y niños muy pequeños (de menos de 1 mes) la dosis debe ser más baja. Se recomienda una dosis inicial de 15 mg/kg seguido de 10 mg/kg cada 12 horas durante la primera semana y cada 8 horas hasta el mes de edad. Cada dosis debe administrarse en un periodo mínimo de 60 minutos. Se recomienda controlar los niveles plasmáticos en este grupo de pacientes y utilizar vancomicina únicamente para tratar infecciones graves.

Ancianos

Habitualmente presentan la función renal disminuida debido a la edad por lo que se recomienda ajustar las dosis en función del aclaramiento de creatinina. Puede ser recomendable, así mismo, un control de la función auditiva.

La eficacia y toxicidad de vancomicina están relacionadas con las concentraciones plasmáticas del fármaco. El rango terapéutico propuesto oscila entre 5 y 10 µg/ml para la concentración mínima (C_{min}, determinada al final del intervalo de administración). La concentración máxima (C_{max}, determinada unas tres horas después del inicio de la administración intravenosa) no debe ser superior a los 40 µg/ml.

Se recomienda ajustar la pauta posológica en función de los niveles plasmáticos del fármaco y del aclaramiento renal en los siguientes casos:

- En insuficiencia renal o en pacientes con inestabilidad hemodinámica.
- Cuando se administren de forma concomitante otros fármacos nefrotóxicos u ototóxicos.
- En tratamientos prolongados.
- En los siguientes grupos de edad: pacientes de más de 65 años, niños < 1 mes y prematuros.

Ajuste de dosis en situaciones especiales

La vancomicina se elimina principalmente por vía renal y por tanto en aquellos pacientes que presenten alteraciones de la función renal la posología deberá individualizarse para evitar que se produzcan acumulaciones del fármaco. Se recomienda medir las concentraciones séricas de creatinina al inicio y periódicamente durante el tratamiento, especialmente en pacientes inestables o con insuficiencia renal grave.

Se propone el siguiente esquema para modificar el intervalo de dosificación en función del aclaramiento de creatinina:

<i>Cr Cl (ml/min)</i>	<i>Intervalo de dosificación (horas):</i>
> 50	12
25 - 50	24
≤ 25	48 o mayor pero se recomienda calcularlo a partir de las concentraciones plasmáticas.

Para calcular el aclaramiento de creatinina a partir de la creatinina sérica puede utilizarse la fórmula siguiente:

Hombres:

$$\text{CrCl (ml/min)} = \frac{\text{Peso (kg)} \times (140 - \text{edad en años})}{72 \times \text{conc. de creatinina sérica (mg/dl)}}$$

Mujeres:

$$\text{Cr Cl (ml/min)} = 0,85 \times \text{Cr Cl (hombres)}$$

Esta fórmula no debe emplearse en determinados estados (shock, insuficiencia cardíaca severa, oliguria, obesidad, malnutrición, edema o ascitis) ya que daría una sobrestimación del valor real.

Duración del tratamiento:

Dependerá de la gravedad de la infección y de la respuesta clínica del paciente. En el caso de la endocarditis estafilocócica la duración del tratamiento no será inferior a las 3 semanas.

Forma de administración:

Vancomicina se administra por vía intravenosa. Puesto que los efectos adversos que se producen durante la administración están relacionados con la concentración y la velocidad de administración, la dosis debe diluirse hasta una concentración máxima de 5 mg/ml y administrarse lentamente. El tiempo de administración será igual o superior a una hora. La velocidad de infusión debe disminuirse en el caso de que el paciente experimentara el “síndrome del hombre rojo” (ver el punto 4.8 “Reacciones Adversas”).

En los pacientes en los que sea preciso una restricción de líquidos, podrán emplearse concentraciones de 10 mg/ml pero se deberá tener en cuenta que el uso de concentraciones tan elevadas puede aumentar el riesgo de efectos indeseables.

Administración oral

La forma parenteral de vancomicina puede administrarse vía oral únicamente para el tratamiento de la colitis pseudomembranosa y enterocolitis estafilocócica:

Adultos: La dosis usual es de 500 mg divididos en cuatro administraciones durante 7 a 10 días. En casos graves puede aumentarse hasta 2 gramos/día.

Niños: La dosis usual es de 40 mg/kg al día divididos en 3 ó 4 tomas durante 7 a 10 días. La dosis total no debe exceder los 2 g al día.

La dosis a administrar puede reconstituirse en 30 ml de agua y puede administrarse por boca o por sonda nasogástrica. Pueden añadirse edulcorantes a la solución reconstituida para mejorar su sabor.

4.3 Contraindicaciones:

VANCOMICINA ACCORD está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad conocida a este medicamento.

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo:

Vancomicina no debe administrarse vía intramuscular y debe evitarse la extravasación en la infusión intravenosa ya que es muy irritante y existe riesgo de necrosis tisular.

Con la administración de vancomicina puede presentarse tromboflebitis, cuya frecuencia y gravedad pueden minimizarse administrando el fármaco lentamente y diluido (2,5 a 5 mg/ml) y alternando el lugar de administración.

Puesto que vancomicina es potencialmente ototóxica y nefrotóxica debe administrarse con precaución a individuos con la función renal alterada y a pacientes que hayan padecido con anterioridad pérdidas auditivas. Debe tenerse precaución cuando se administre concomitantemente con otros fármacos ototóxicos o nefrotóxicos. En pacientes ancianos, las pruebas seriadas de la función auditiva pueden ser de utilidad a fin de minimizar el riesgo de ototoxicidad.

Se advierte que tras la administración oral de dosis múltiples, la vancomicina puede absorberse parcialmente por esta vía, especialmente si existen lesiones en la mucosa gástrica.

Se han descrito casos aislados de colitis pseudomembranosa debida a *C. difficile* en pacientes que recibieron vancomicina intravenosa.

Se han comunicado casos de neutropenia reversible en pacientes que recibían vancomicina (ver *Reacciones Adversas*). En los pacientes que reciban tratamientos prolongados con vancomicina o que reciban vancomicina concomitantemente con fármacos que puedan causar neutropenia, deben realizarse hemogramas periódicos.

El uso concomitante de vancomicina y agentes anestésicos en niños se ha asociado a eritema y reacciones anafilactoides. Si ha de administrarse vancomicina en la profilaxis quirúrgica se aconseja administrar los anestésicos una vez haya finalizado la infusión de vancomicina.

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

La vancomicina potencia el efecto nefrotóxico y neurotóxico de otros medicamentos que pueden producir así mismo efectos neurotóxicos y/o nefrotóxicos (tales como anfotericina B, aminoglucósidos, bacitracina, polimixina B, colistina, viomicina o cisplatino).

En el caso de administración oral ha de tenerse en cuenta que, las resinas de intercambio iónico (colestiramina y colestipol) pueden reducir la actividad antibacteriana de la vancomicina en el intestino.

4.6 Embarazo y Lactancia:

Uso en embarazo: La seguridad de vancomicina en el embarazo no ha sido establecida en ensayos clínicos controlados. Dado que los estudios en animales de experimentación son insuficientes para valorar la seguridad del medicamento con respecto a la reproducción, desarrollo embrio-fetal, el curso de la gestación y el desarrollo peri y post natal, vancomicina únicamente se administrará en el embarazo después de una cuidadosa evaluación riesgo-beneficio.

Lactancia: Puesto que vancomicina es excretada a través de leche materna, se valorará el paso a lactancia artificial en el caso de estar indicado su uso.

4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir vehículos y utilizar maquinaria:

No se han descrito

4.8. Reacciones adversas:

Relacionadas con la administración: durante la infusión rápida de vancomicina o después de ésta, los pacientes pueden manifestar reacciones anafilactoides, incluidas hipotensión, sibilancias, disnea, urticaria o prurito, dolor y espasmo muscular del pecho y la espalda. Vancomicina puede producir el llamado “síndrome del cuello rojo” o del “hombre rojo” que cursa con la aparición durante la administración de hormigueos, prurito intenso y una erupción maculopapular en la parte superior del cuello, cara y extremidades superiores.

En general estas reacciones cesan en 20 minutos, pero pueden persistir varias horas y se relacionan con la velocidad de administración y la concentración de la solución. Cuando vancomicina se administra en infusión diluida lenta durante 60 minutos, tales eventos son poco frecuentes.

Ototoxicidad: Se ha descrito neurotoxicidad en el nervio acústico con tinnitus y pérdida de audición de tonos altos, que puede desembocar en sordera, no siempre reversible, al suspender el tratamiento. Se ha relacionado con el mantenimiento de concentraciones elevadas durante un periodo prolongado y con la asociación a otros fármacos ototóxicos o con la presencia de pérdidas auditivas previas. Esporádicamente se han descrito casos de toxicidad vestibular con vértigos y mareos.

Nefrotoxicidad: en raras ocasiones se han descrito casos de insuficiencia renal, manifestada sobretodo por un incremento de la creatinina sérica o del BUN, principalmente en pacientes que recibieron dosis elevadas de vancomicina durante un periodo prolongado. Raramente se han producido casos de nefritis intersticial en pacientes que recibieron aminoglicósidos concomitantemente o que tenían alguna disfunción renal previa.

Reacciones Hematológicas: se han descrito casos raros de leucopenia, eosinofilia y trombocitopenia reversibles al suspender el tratamiento.

Flebitis: se han descrito casos de inflamación en el lugar de administración.

Miscelánea: se han comunicado casos de anafilaxia, fiebre medicamentosa, náuseas, escalofríos, eosinofilia, exantemas, incluso dermatitis exfoliativa, síndrome de Steven-Johnson y más raramente vasculitis asociados al tratamiento con vancomicina.

4.9. Sobredosificación:

En caso de sobredosis es recomendable instaurar terapia de apoyo con especial control de la función renal. La eliminación de vancomicina mediante diálisis es deficiente. Se ha informado que la hemofiltración y la hemoperfusión con resinas o carbón activado consiguen eliminar hasta un 35 % de vancomicina. En el manejo de la sobredosis, se debe considerar siempre la posibilidad de acumulación del fármaco, las interacciones entre fármacos y la posibilidad de una farmacocinética particular en un paciente determinado.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propiedades farmacodinámicas:

Vancomicina es un antibiótico glicopeptídico derivado del microorganismo *Nocardia orientalis* (antes *Streptomyces orientalis*), con acción frente a la mayoría de bacterias grampositivas (tanto aerobias como anaerobias): *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Corinebacterium spp.*, *Clostridium spp.*, *Enterococcus spp.*, *Listeria spp.*, algunas especies de *Bacillus* y algunas cepas de *Actinomyces*.

Vancomicina es bactericida a concentraciones de 0,5 a 3 mg/l frente a la mayoría de bacterias susceptibles. Concentraciones de 10 mg/l son bactericidas frente a los *staphylococcus* productores de beta-lactamasas y las especies meticilin resistentes. En algunas especies de *Enterococcus* actúa como bacteriostático. Es eficaz en el tratamiento de infecciones producidas por bacterias resistentes a los antibióticos beta-lactámicos.

Su acción bactericida es debida a: (1) inhibe la biosíntesis de la pared celular, (2) interfiere en la síntesis del RNA, (3) daña las membranas citoplasmáticas. La multiplicidad de lugares de acción puede explicar el escaso desarrollo de resistencias a este antibiótico, aunque recientemente se ha detectado un incremento de *Enterococcus* resistentes. No se conocen resistencias cruzadas entre vancomicina y otros antibióticos.

Si se determina la sensibilidad bacteriana usando el método de difusión homologado por NCCLS con un disco de 30 µg de vancomicina, los microorganismos sensibles producen zonas de inhibición de 12 mm o más, los resistentes de 9 mm o menos y los de sensibilidad intermedia entre 10 y 11 mm.

5.2 Propiedades farmacocinéticas:

Vancomicina se absorbe muy poco por vía oral y debe administrarse vía endovenosa. Después de la administración oral se alcanzan concentraciones plasmáticas de 1 µg/ml, aunque pueden ser superiores

en casos de lesión de la mucosa gástrica. La administración intramuscular tampoco es posible ya que por tratarse de un fármaco muy irritante la inyección es muy dolorosa e incluso puede provocar necrosis tisular.

Vancomicina es ampliamente distribuida tras la administración intravenosa alcanzándose concentraciones elevadas en hígado, pulmón, corazón y riñones. En el estado de equilibrio estacionario (que se produce a los 1-2 días, dependiendo de la semivida de eliminación), el volumen de distribución es de 0.4 a 0.9 l/kg. La concentración plasmática máxima, 3 horas después del inicio de la administración de 15 mg/kg es de 20 a 40 µg/ml. Difunde a través de la membrana placentaria pero muy poco a través de las meninges (en ausencia de inflamación). Se une poco a proteínas plasmáticas (30 a 60%), eliminándose fundamentalmente por vía renal, por filtración glomerular pasiva, recogiéndose hasta un 90 % de la dosis inalterada en la orina. La semivida de eliminación es de 3 a 9 horas en pacientes con la función renal normal.

El aclaramiento renal y sistémico total de vancomicina puede hallarse reducido en las personas de edad avanzada.

Vancomicina no se elimina por hemodiálisis ni tampoco mediante diálisis peritoneal. Únicamente mediante hemofiltración continua se consigue aclarar un porcentaje significativo de fármaco.

La administración intraperitoneal ofrece una biodisponibilidad del 50-65%. En pacientes en diálisis peritoneal crónica, una dosis de carga de 30 mg/kg por esta vía seguida de 1.5 mg/kg en cada recambio de líquido de diálisis (aproximadamente 2 litros) puede dar lugar a concentraciones plasmáticas superiores a 10 µg/ml durante 180 horas.

5.3 Datos preclínicos sobre seguridad:

Carcinogénesis, mutagenicidad y alteraciones de la fertilidad: Aunque no se han realizado estudios a largo plazo en animales para evaluar el potencial carcinogénico, no se ha encontrado potencial mutagénico de vancomicina en las pruebas estándar de laboratorio. Por otro lado, después de una dilatada experiencia con el uso de vancomicina en humanos no se han detectado efectos carcinogénicos ni mutagénicos. Por el mismo motivo tampoco es probable que vancomicina afecte a la fertilidad.

6. DATOS FARMACÉUTICOS:

6.1 Relación de excipientes:

Esta formulación no precisa excipientes.

6.2 Incompatibilidades:

La solución de vancomicina tiene un pH bajo y puede causar inestabilidad química o física de otros compuestos.

Se recomienda no asociar en la misma solución vancomicina con aminofilina, cloramfenicol succinato sódico, heparina sódica y penicilina G potásica ya que pueden producirse precipitados.

Se ha comunicado también incompatibilidad con: aztreonam, barbitúricos, bencilpenicilina (en soluciones de dextrosa), ceftazidima, ceftriaxona, clorotiazida sódica, fosfato sódico de dexametasona, expansores del plasma de gelatina y poligelina, iradubicina, metilicina sódica, bicarbonato sódico, ticarcilina y warfarina sódica.

6.3 Período de validez:

2 años

6.4 Precauciones especiales de conservación:

Los viales pueden conservarse a temperatura ambiente (15° a 30°C).

Una vez reconstituida la solución guardarla en el refrigerador, en estas condiciones el preparado conserva sus propiedades durante 96 horas.

Vancomicina diluida en las soluciones para infusión recomendadas a concentraciones iguales o inferiores a 5 mg/ml es estable durante 96 horas en nevera.

6.5 Naturaleza y contenido del recipiente:

VANCOMICINA ACCORD 500 mg:

vial de vidrio de 10 ml con 500 mg de vancomicina.

VANCOMICINA ACCORD 1 g:

vial de vidrio de 20 ml con 1g de vancomicina.

6.6 Instrucciones de uso / manipulación:

1. Administración intravenosa

Reconstituir en el momento de su empleo. Añádanse 10 ml de agua para inyección al contenido de un vial de 500 mg de polvo seco y estéril ó 20 ml en los viales de 1 g. Diluir la solución obtenida con 100 ó 200 ml de solución de cloruro sódico 0.9% o de solución glucosada al 5% hasta conseguir diluciones inferiores a 5 mg/ml, aproximadamente.

Vancomicina es compatible con las siguientes soluciones para infusión: dextrosa al 5% y cloruro sódico al 0.9%; solución Ringer-lactato y dextrosa al 5%; solución Ringer-acetato. Vancomicina es también compatible con las soluciones para diálisis peritoneal.

Antes de la administración parenteral debe inspeccionarse visualmente la solución. Administrar únicamente soluciones claras y libres de partículas.

2. Administración oral: La dosis apropiada puede reconstituirse con 30 ml de agua y darse a beber al paciente. Pueden agregarse edulcorantes a la solución a fin de mejorar su sabor.

7. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO PERMANENTE O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN:

Accord Healthcare, S.L.U

Moll de Barcelona s/n. World Trade Center. Edifici Est 6ª planta

08039– Barcelona

España