

## FICHA TÉCNICA

### 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

CICLOPIROX OLAMINA CAPITEC 15 mg/g CHAMPÚ

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

100 g de champú contienen 1,5 g de Ciclopirox Olamina (15 mg/g)  
Véase la lista de excipientes en la sección 6.1.

### 3. FORMA FARMACÉUTICA

Champú.

Solución viscosa de incolora a amarillenta.

### 4. DATOS CLÍNICOS

#### 4.1. Indicaciones terapéuticas

Tratamiento de la dermatitis seborreica del cuero cabelludo.

#### 4.2. Posología y forma de administración

Para uso cutáneo.

Ciclopirox OLAMINA CAPITEC 15 mg/g Champú debe utilizarse dos o tres veces a la semana. Aplicar sobre el cabello húmedo una cantidad de ciclopirox OLAMINA CAPITEC 15 mg/g Champú suficiente como para producir abundante espuma. Masajear vigorosamente el cuero cabelludo y las zonas adyacentes con las puntas de los dedos. A continuación aclarar bien el cabello y repetir el proceso. Dejar el champú en contacto con el cuero cabelludo durante 3-5 minutos.

El periodo recomendado de tratamiento es de 4 semanas.

Este producto no ha sido probado en niños.

#### 4.3. Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la Ciclopirox Olamina o a cualquiera de los excipientes.

#### 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo

Ciclopirox OLAMINA CAPITEC 15 mg/g Champú está destinado exclusivamente a uso externo.

Al igual que con todos los champús, debe evitarse el contacto con los ojos. En caso de contacto accidental con los ojos, aclarar con abundante agua.

Ciclopirox OLAMINA CAPITEC 15 mg/g Champú puede provocar, en raras ocasiones, irritación cutánea. En caso de producirse una irritación persistente, debe suspenderse el tratamiento.

Los pacientes con sensibilidad conocida a la Fragancia deben evitar usar Ciclopirox OLAMINA CAPITEC 15 mg/g Champú.

#### **4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción**

No se dispone de datos sobre interacciones medicamentosas. Sin embargo, dado el bajo nivel de absorción sistémica, es poco probable que se produzcan interacciones medicamentosas.

#### **4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia**

##### Embarazo

No se dispone de datos adecuados sobre el empleo de Ciclopirox Olamina durante el embarazo. Los datos obtenidos con Ciclopirox Olamina en animales no señalan efectos nocivos sobre el embrión o el feto. Dado el poco tiempo de contacto con la piel y el bajo nivel de absorción sistémica de Ciclopirox OLAMINA CAPITEC 15 mg/g Champú, este champú se puede emplear durante el embarazo.

##### Lactancia

Ciclopirox OLAMINA CAPITEC 15 mg/g Champú se puede emplear durante la lactancia.

#### **4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas**

No procede.

#### **4.8. Reacciones adversas**

Ciclopirox OLAMINA CAPITEC 15 mg/g Champú puede provocar, en raras ocasiones, irritación cutánea. En caso de producirse una irritación persistente, debe suspenderse el tratamiento.

En los ensayos clínicos, todos los efectos fueron leves y localizados y no se observaron diferencias en cuanto a incidencia entre el grupo que recibió vehículo y el grupo que recibió el principio activo.

#### **4.9. Sobredosis**

No procede.

### **5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS**

#### **5.1. Propiedades farmacodinámicas**

Grupo farmacoterapéutico: Antifúngicos de uso tópico dermatológico.  
Código ATC: D01 A E14.

La Ciclopirox Olamina es un agente antifúngico (de la familia de las piridonas) que se muestra activo *in vitro* frente a *Pityrosporum* spp (también conocidas como *Malassezia* spp). Estas levaduras están implicadas como agente causal de caspa y dermatitis seborreica. La Ciclopirox Olamina exhibe cierta actividad antibacteriana frente a varias bacterias Gram-positivas y Gram-negativas.

También posee actividad antiinflamatoria, como consecuencia de su capacidad para inhibir la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos.

Ciclopirox OLAMINA CAPITEC 15 mg/g Champú muestra actividad antifúngica *in vivo* frente a *Malassezia* spp.

## **5.2. Propiedades farmacocinéticas**

La aplicación tópica de Ciclopirox Olamina en forma de crema al 1% sobre la piel humana demostró un nivel muy bajo de absorción percutánea, detectándose en orina entre un 1,1% y un 1,7% de la dosis aplicada.

El potencial de absorción sistémica de la Ciclopirox Olamina a partir de un champú que contiene Ciclopirox Olamina al 15 mg/g y que desaparece con el lavado es muy bajo.

## **5.3. Datos preclínicos sobre seguridad**

Los datos preclínicos no han demostrado hallazgos prohibitivos en cuanto a toxicología aguda, crónica o reproductiva, mutagenicidad o carcinogenicidad.

## **6. DATOS FARMACÉUTICOS**

### **6.1. Lista de excipientes**

Laurileter sulfato sódico al 70%  
Cocamidopropil betaína  
Fosfato disódico dodecahidrato  
Ácido cítrico monohidrato (ajustador de pH)  
Monoetanolamida de ácidos grasos de coco, propoxilados  
Hexilenglicol  
Alcohol oleílico  
Polisorbato 80  
Polyquaternium 10  
Hidróxido de sodio (ajustador de pH)  
Agua purificada  
Fragancia Rifskin 54193

### **6.2. Incompatibilidades**

No procede.

### **6.3. Periodo de validez**

2 años.

Una vez abierto el frasco, el champú se debe utilizar en un plazo de 8 semanas.

### **6.4. Precauciones especiales de conservación**

No hay precauciones especiales.

### **6.5. Naturaleza y contenido del envase**

Botella de HDPE con tapones de rosca de polipropileno.  
Tamaño de envase de 100ml.

#### **6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones**

Ninguna instrucción especial.

#### **7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Laboratorio Reig Jofré, SA  
C/ Gran Capitán, 10  
08970 Sant Joan Despí  
Barcelona-España

#### **8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

#### **9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN**

#### **10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO**

Abril 2023.